

分 類	使用可否
一般米	可 ○
飼料米	可 ○
WCS	可 ○

水稲用一発処理除草剤

農林水産省登録 第23339号

サラブレッド KAI

ジャンボ

®は協友アグリ株の登録商標です。

3成分配合

ピラクロニル

オキサジクロメホン

イマゾスルフロ

サラブレッドに
新たな風!

難防除雑草に
効く!

クログワイ コナギ コウキヤガラ
ナガボノウルシにも!



5~6cmの湛水状態で
お使いください!

稲発酵粗飼料 (WCS) 用イネにも使えます!



サンケイ化学株式会社

特長

- 高性能** ノビエを始めS U抵抗性雑草や難防除雑草に優れた効果を示す！
- 省力性** 畦から小包装（パック）を投げ入れるだけ！
- 安全性** 水稻への安全性が高く、使いやすい！ 移植直後からの使用が可能！



適用雑草の範囲及び使用方法

■有効成分（一般名） イマズスルフロン：2.25% オキサジクロメホン：0.75% ピラクロニル：5.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	イマズスルフロンを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装（パック） 10個（400g） /10a	1回	水田に小包装（パック）のまま投げ入れる	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 及び ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで						

2021年10月現在の登録内容

散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	2.5葉期まで
ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	2葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生前～再生始期まで
オモダカ、クログワイ	発生前～発生始期まで
コウキヤガラ	発生始期まで

本剤を使用した圃場の状態



△ 使用上の注意事項

- 直播水稻栽培では、稲の根が露出する条件では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止め5～6cm湛水状態に保ってください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤は小包装（パック）のまま、10アールあたり10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないので注意してください。
- 藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用をさけてください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び植え付けはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田及び砂質土で漏水の大きな水田（減水深2cm/日を超える水田）では、薬害が発生するおそれがあるので使用しないでください。
- 著しい降雨が予想される場合には、除草効果が低下するおそれがあるので、使用を控えてください。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、セリ、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合は異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

●空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



JAグループ

農 協

全 農

経済連

全 農 は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本 社 鹿児島市南栄2丁目9番地 ☎ (099) 268-7588