

使いやすいベイト剤の新提案

殺虫剤

アクセルベイト®

ネキリムシ類、 コオロギ類を防除!

ハスモンヨトウにも!



ネキリムシ類



コオロギ類



【適用拡大】
たまねぎ



株元に散布するだけ!!



特長

**新成分の力で問題害虫に高い効果！**

新しい有効成分メタフルミゾンは害虫への経口作用が強く、ベイト剤に適しています。
既存剤の効果が低下したハスモンヨトウやネキリムシ類の老齢幼虫にも高い効果を発揮します。

**コオロギ類にも有効！**


コオロギ類にも効果を示し、同時防除ができます。

**省力的に害虫を防除できるベイト剤です！**

害虫を誘引し、有効成分を摂食させて殺虫するベイト剤です。
作物の株元にまくだけで、簡単にネキリムシ類やハスモンヨトウ、コオロギ類を防除できます。

上手な使い方

ネキリムシ類対象の場合
幼苗期に処理 または 定植時に処理



※作物ごとの収穫前日数を遵守してください。

処理後の降雨に注意

降雨等で粒が崩壊すると十分に効果を発揮できません。処理後に降雨があった場合には使用回数の範囲内で再処理するか、降雨が予想される時には降雨後に処理してください。

適用病害虫および使用方法

が2021年12月に適用拡大になりました。

<2021年12月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農業の総使用回数
キャベツ はくさい	ネキリムシ類 ハスモンヨトウ コオロギ類	3~6kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
だいこん	ネキリムシ類		収穫前日まで	2回以内		2回以内
ブロッコリー	ネキリムシ類 コオロギ類			3回以内 2回以内		3回以内 2回以内
非結球レタス レタス ねぎ たまねぎ しょうが	ネキリムシ類	6kg/10a		3回以内		3回以内
アスパラガス いちご	ハスモンヨトウ	3~6kg/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
にんじん	ネキリムシ類 ハスモンヨトウ コオロギ類	6kg/10a		3回以内		3回以内
ごぼう だいず えだまめ	ネキリムシ類	3~6kg/10a		3回以内		3回以内
花き類・観葉植物			生育期	6回以内		6回以内

使用上の注意事項

- 本剤が作物体にかからないよう株元の土壌表面に散布してください。
- ハスモンヨトウの防除に使用する場合は、地表部に生息する幼虫に対し有効であるので時期を失しないように使用してください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。●使用後の空袋等は農場などに放置せず、適切に処理してください。