

ロツクオン[®]

有効成分：フルベンジアミド5.0%

登録
取れました!

さくらの いぬまきの
イラガ類、キオビエダシヤクにも
使えるようになりました!



① ユニークな作用機作

全く新しいタイプの殺虫剤で、筋肉を収縮させるユニークな作用機作を有します。



② 速やかな食害抑制効果と優れた効果持続性

速やかに摂食行動を阻害し、散布後は長期間安定した効果を示します。



③ チョウ目害虫に対する高い選択性

幅広い種類のチョウ目害虫に高い効果を示し、有用昆虫(カイコを除く)に影響が少ないです。



④ ほとんど臭わない!

臭いが気にならない殺虫剤です。

イヌマキの葉を食べる“キオビエダシャク” ～ 発生の増減要因とその防除 ～

【適用病害虫名及び使用方法】

2022年11月18日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む 農薬の総使用回数
樹木類 (いぬまき、さくらを除く)	ケムシ類	1000倍	200～700 ㍓	発生初期	2回以内	散布	2回以内
いぬまき	ケムシ類 キオビエダシャク						
さくら	ケムシ類 イラガ類						


どのくらい生きるの？

- ・昼行性
- ・白色系の花によく集まる。



約14日間

約10日間



- ・樹皮の裂け目に一卵ずつ産卵
(300卵/頭)

- ・土面の葉の下や土中に浅く潜り込み蛹化



約14日間

約30日間



- ・ふ化直後の幼虫は新葉の裏面を好食

1世代約2ヶ月、年4～5回発生！

なぜ、急に増えたり、減ったりするの？

高温と低温に弱い → 幼虫期の高温・低温日数が増減ポイント！

年間発生動向（推測）

区 分	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
蛹 期												
成虫期												
幼虫期												

最高気温

34℃以上

平均気温

8℃以下

7～8月と12～1月の気温が発生増減の一つの目安！

どうやって駆除すればいいの？

発生が**少ない**場合 → 木を揺すり、落下した幼虫を捕殺

発生が**多い**場合 → **幼虫発生時期**に『**ロックオン**』を散布

殺虫効果が長い（3～4ヶ月程度）
成虫の確認にてイヌマキへの散布！

幼虫の駆除が重要！