

しつこいアワも速効クリア

消泡スプレー

あわナックス[®]

あわナックス[®]の消泡効果

湧き上がる泡も 素早く消える！



薬液調製直後



あわナックス噴霧直後

あわナックス[®]の特長

- 数秒で消泡効果を発揮。
- 希釈液調製前にあらかじめ処理しても消泡効果を発揮。
- 2回目の連続調製時にも消泡効果が持続する。
- 使用する薬液への展着性、乳化性等に影響がない。



サンケイ化学株式会社



製品情報はこちら

消泡スプレー[®] あわナックス

有効成分：高重合シリコン

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称）

有効年限：3年

規格：300 mL（トリガー式スプレータイプ）

使用方法

使用目的	使用方法
農薬散布液調製時および散布器具等洗浄時の消泡または泡立ち防止。	噴霧

- 泡に向けて吹きつけるように複数回噴霧してください。噴霧後、薬液を攪拌すると、より確実に消泡できます。
- 希釈液調製前に噴霧しておくこと、泡の発生を防止することができます。
- 複数回の薬液調製を行う場合、最初の薬液調製時に本剤を使用すると2回目の薬液調製時の泡の発生を抑えることができます。

使用の目安

泡を消す場合

100 L に対して1～2回
噴霧してください。



泡を発生しにくくする場合


〈薬液調製前に〉
100 L に対して3～8回
噴霧してください。




効果持続性

消泡効果と持続性

250 mL シリンダー試験



300 L タンクにおける連続調製時消泡確認試験



使用上の注意事項

- 使用直前に必ずよく振ってからご使用ください。
- 起泡性を必要とするフォームスプレー（泡散布）用の薬液にはご使用になれません。
- ジベレリンなどの植物成長調整剤の薬液にはご使用になれません。
- ご使用の際はマスク、手袋などをして噴霧した霧を吸入しないように注意し、作業後は頭、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 直射日光をさけ、子供の手の届かない場所に、食品と区別して保管してください。
- 5℃以下の低温な場所へ長期保管した場合、噴霧が不十分になる場合があります。その場合は室温にて保温後、よく振ってご使用いただければ、噴霧が良好になります。
- -5℃以下の場所へ保管すると、凍結するおそれがありますので注意してください。
* 凍結（固化）した場合、室温にして解凍後、よく振ってご使用いただければ、消泡効果へ影響はありません。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

