適用拡大

使用方法追加

［無人航空機による散布］
未成熟とうもろこし

※詳細は裏面でご確認ください。



豊作の女神

殺虫剤

ディアナ®SC



様々な害虫から大事な作物を守り、豊かな実りをかなえます。

広い殺虫スペクトラム　速やかな食害抑制効果　収穫前日まで使用可能

（使用方法「散布」の場合。ただし稲は収穫7日前まで。）



【適用害虫と使用方法】（裏面もご覧ください。）

2026年6月現在の登録内容（太字は2026年6月10日適用拡大）

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
稲	イネツトムシ、コブノメイガ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ	4,000～6,000	60～150ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	※2
		32～48	0.8ℓ/10a			無人航空機による散布	
だいず	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類	2,500～5,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで		散布	2回以内
ねぎ	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ネギコガ、**ハモグリバエ類**						
	アザミウマ類	48	**1.6～3.2ℓ/10a**			無人航空機による散布	
		96	3.2ℓ/10a				
たまねぎ	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、**ハモグリバエ類**、ハスモンヨトウ	2,500～5,000	100～300ℓ/10a			散布	
	アザミウマ類、**ハモグリバエ類**、ハスモンヨトウ	48	1.6～3.2ℓ/10a			無人航空機による散布	
		96	3.2ℓ/10a				
キャベツ	アザミウマ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ウワバ類、オオタバコガ、ハモグリバエ類	2,500～5,000	100～300ℓ/10a			散布	3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）
	アオムシ、オオタバコガ、コナガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	48	1.6～3.2ℓ/10a			無人航空機による散布	
		96	3.2ℓ/10a				
	アザミウマ類	50～200	※1	育苗期後半	1回	灌注	
ブロッコリー	アザミウマ類、ウワバ類、アオムシ、オオタバコガ、コナガ シロイチモジヨトウ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	2,500～5,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
	アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	48	**1.6～3.2ℓ/10a**			無人航空機による散布	
		96	3.2ℓ/10a				
トマト ミニトマト	コナジラミ類	2,500	100～300ℓ/10a			散布	2回以内
	トマトキバガ、**クロバネキノコバエ類** アザミウマ類、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2,500～5,000					

※1：セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊（30×60cm・使用土壌約3～4ℓ）当り0.5ℓ　※2：3回以内（直播での は種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）

ディアナは住友化学（株）の登録商標

様々な害虫から大事な作物を守る！ 殺虫剤 ディアナ® SC

【適用害虫と使用方法】（表面もご覧ください。）

農林水産省登録 第22910号
有効成分：スピネトラム…11.7%
殺虫剤分類 5

2026年6月現在の登録内容
（太字は2025年10月1日、10月7日、2026年6月10日適用拡大）

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
なす	アザミウマ類、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2,500～5,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	コナジラミ類	2,500					
ピーマン	アザミウマ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ	2,500～5,000					
とうがらし類 しょくようほおずき	アザミウマ類	2,500					
はくさい	アザミウマ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ウワバ類、オオタバコガ	2,500～5,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 （定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内）
カリフラワー	コナガ、アザミウマ類、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ						
だいこん	キスジノミハムシ	2,500					2回以内
かぶ	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ウワバ類、カブラハバチ、ハモグリバエ類	2,500～5,000					
	コナガ、ハスモンヨトウ、アオムシ						
非結球あぶらな科葉菜類 （こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く）	アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、**ハモグリバエ類**						
みしまさいこ	ハスモンヨトウ	2,500～5,000			4回以内 （1年間に2回以内）		4回以内 （1年間に2回以内）
こまつな	ハクサイダニ	2,500			2回以内		2回以内
	アザミウマ類、アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、**ハモグリバエ類**	2,500～5,000					
チンゲンサイ	アザミウマ類、コナガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ						
なばな類	アザミウマ類、**ハモグリバエ類**、コナガ、ハスモンヨトウ、ハクサイダニ						
しゅんぎく	アザミウマ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ハクサイダニ						
食用ぎく、きく（葉）	アザミウマ類、オオタバコガ、ハモグリバエ類	2,500～5,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
食用ミニバラ	コナジラミ類	2,500					
	アザミウマ類、オオタバコガ	2,500～5,000					
にんじん	ハスモンヨトウ、**キアゲハ**						
きゅうり メロン	コナジラミ類	2,500					
	アザミウマ類、ハモグリバエ類、ウリノメイガ	2,500～5,000					
すいか	コナジラミ類	2,500					
	アザミウマ類、オオタバコガ、ウリノメイガ、ハスモンヨトウ	2,500～5,000					
かぼちゃ	ハスモンヨトウ						
とうがん	アザミウマ類	2,500					
葉たまねぎ	アザミウマ類、**ハモグリバエ類**、ハスモンヨトウ、**シロイチモジヨトウ**	2,500～5,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
にら	ネギコガ	**2,500～5,000**					
	アザミウマ類	2,500～5,000					
にら（花茎）	ネギコガ	**2,500～5,000**					
にんにく	アザミウマ類、ネギコガ	2,500～5,000					
らっきょう	アザミウマ類、ハモグリバエ類						3回以内 （植付前までの処理は1回以内、植付後は2回以内）
	ネダニ類	2,500	—	植付前	1回	30分間種球浸漬	
ほうれんそう	アザミウマ類、ハモグリバエ類、シロオビノメイガ、ハクサイダニ、ハスモンヨトウ	2,500～5,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ケナガコナダニ類	2,500					
つるむらさき	ハスモンヨトウ						
レタス、非結球レタス	ハモグリバエ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類	2,500～5,000					
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ						
	コナジラミ類、クロバネキノコバエ類	2,500					
アスパラガス	コナジラミ類		100～500ℓ/10a				
	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ジュウシホシクビナガハムシ	2,500～5,000	100～300ℓ/10a				
未成熟とうもろこし	アワノメイガ、オオタバコガ	**48**	1.6～3.2ℓ/10a			**無人航空機による散布**	
		96	3.2ℓ/10a				
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、ヒルガオハモグリガ	**2,500～5,000**	100～300ℓ/10a			散布	
		32～40	0.8～1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		40～80	1.6ℓ/10a				
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	2,500～5,000	100～300ℓ/10a			散布	2回以内
てんさい	ヨトウムシ、シロオビノメイガ	5,000～7,500					
さといも	ハスモンヨトウ、セスジスズメ	2,500～5,000					
セルリー	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類						
豆類（未成熟、ただし、さやいんげんを除く）豆類（種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く）	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類						
さやいんげん	アザミウマ類、ハモグリバエ類、アズキノメイガ、ハスモンヨトウ						
あずき	アザミウマ類、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ						
	ノメイガ類	2,500～7,500					
モロヘイヤ **なんてん（葉）**	アザミウマ類	2,500					
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノコカクモンハマキ、チャノホソガ チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャトゲコナジラミ、ニトベミノガ	2,500～5,000	200～400ℓ/10a	摘採前日まで	1回		1回
花き類・観葉植物（りんどうを除く）	アザミウマ類、オオタバコガ、ハモグリバエ類、イラクサギンウワバ	2,500	100～300ℓ/10a	発生初期	2回以内		2回以内
	コナジラミ類、クロバネキノコバエ類						
りんどう	アザミウマ類、オオタバコガ、ハモグリバエ類、イラクサギンウワバ、リンドウホソハマキ	2,500～5,000					
	コナジラミ類、クロバネキノコバエ類	2,500					
わた	オオタバコガ	2,500～5,000					
	アザミウマ類	2,500					
樹木類	ハマキムシ類	2,500～5,000	200～700ℓ/10a				

使用上の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
  ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  ③関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しないでください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
  ①散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
  ②散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他の散布装置の十分な点検を行ってください。
  ④散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
  ⑤散布終了後は次の事項を守ってください。
  a 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
  b 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器はほ場等に放置せず適切に処理してください。

取扱い

2609SC/ZS7DSC

サンケイ化学株式会社
本　　社　〒891-0122　鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9
宮崎事務所　〒880-0056　宮崎県宮崎市神宮東3-6-19