

豊作の女神



殺虫剤

ディアナ[®] SC

適用拡大

使用方法追加

【無人航空機による散布】
稲、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、かんしょ

害虫追加

こまつなのハクサイダニ
にんにく、にら(花茎)のネギコガ

※詳細は裏面でご確認ください。



様々な害虫から大事な作物を守り、豊かな実りをかなえます。

🌙 広い殺虫スペクトラム 🌙 速やかな食害抑制効果 🌙 収穫前日まで使用可能

(使用方法「散布」の場合、ただし稲は収穫7日前まで。)

【適用害虫と使用方法】(裏面もご覧ください。)

2024年9月現在の登録内容(太字は2024年9月11日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数	
稲	イネツトムシ、コブノメイガ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ	4,000~6,000 32~48	60~150ℓ/10a 0.8ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	※2	
だいず	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類	2,500~5,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで		無人航空機による散布	2回以内	
ねぎ	アザミウマ類	48 96	1.6ℓ/10a 3.2ℓ/10a			無人航空機による散布		
たまねぎ	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ネギコガ、ネギハモグリバエ	2,500~5,000	100~300ℓ/10a			無人航空機による散布		
キャベツ	アザミウマ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ウワバ類、オオタバコガ、ハモグリバエ類	2,500~5,000	100~300ℓ/10a			散布		3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)
ブロッコリー	アザミウマ類、ウワバ類、アオムシ、オオタバコガ、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	2,500~5,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで		2回以内	散布	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内)
	アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	48 96	1.6ℓ/10a 3.2ℓ/10a				無人航空機による散布	
トマト	コナジラミ類	2,500	100~300ℓ/10a	収穫前日まで		2回以内	散布	2回以内
ミニトマト	トマトキバガ アザミウマ類、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2,500~5,000	100~300ℓ/10a					

※1:セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4ℓ)当り

※2:3回以内(直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)

ディアナは住友化学(株)の登録商標

