

殺菌剤

灰色かび病防除に!!

ピクシオ[®] DF

灰色かび病、バイバイ!

高い予防効果・治療効果があり、
既存薬剤に耐性を示す菌にも優れた効果



トマト灰色かび病



ブドウ灰色かび病(落花後の発病)



ピクシオは住友化学(株)の登録商標です。



特長

灰色かび病・菌核病に 高い効果を示します

1 高い予防効果

病原菌の作物への侵入を強く阻止します。

2 治療効果にも優れる

浸達性、浸透移行性に優れ、作物の内部に侵入した菌に対しても高い効果を発揮し、病斑進展を阻止します。

3 耐性菌に効果を発揮

既存薬剤に耐性を示す灰色かび病菌にも高い効果を示します。

上手な使い方

発病を確認したら、 すぐに散布してください

病害防除は予防散布が原則ですが、ピクシオ DFは治療効果にも優れるため、初発確認後の散布でも高い効果が期待できます。病気が蔓延する前に抑えるようにしてください。

本剤のみの連用はさけ、 作用性の異なる剤と組み合わせて 使用してください

耐性菌の発生を防ぐため、ローテーション防除を徹底してください。

耕種的防除と組み合わせて 使用してください

感染源となりうる古い花卉や罹病部は取り除いてください。また過繁茂をさけ、換気に努めてください。

適用病害と使用方法

2023年3月現在の登録内容(太字は2023年2月14日適用拡大)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数※
トマト ミニトマト きゅうり なす	灰色かび病 菌核病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	散布	4回以内
ピーマン						3回以内
すいか メロン	4回以内					
豆類(未成熟)	菌核病		200～700ℓ /10a			3回以内
ぶどう かんきつ						4回以内
もも	灰色かび病		100～300ℓ/10a	発病初期		3回以内
花き類・観葉植物	灰星病					4回以内
	灰色かび病				4回以内	

※本剤およびフェンピラザミンを含む農薬の総使用回数

⚠️<使用上の注意事項> ⚡️

- ・薬液の調製は、まず本剤の所定量に少量の水を加えてかき混ぜ、その後所定量となるよう水を加え十分攪拌してください。
- ・散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- ・散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- ・蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ・かかった場合7日間は給桑しないでください。
- ・施設で使用したあと、施設内に臭気が残る場合には換気を行ってください。
- ・本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように

- 注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ・かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- ・直射日光をさけ、食品と区別した、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

2303SC/OG10



JAグループ

農

協

全農

経済連

全農は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 TEL(099)268-7588
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 TEL(0985)25-7051