

水稻用初・中期一発処理除草剤

ビクトリーZ[®]

ジャンボ

®は協友アグリ(株)の登録商標です。



クログワイ

難防除雑草を強力除草!
稲発酵粗飼料(WCS)に使えます!

コナギ

コウキヤガラ

サンケイ化学株式会社

水稲用初・中期一発処理 除草剤

農林水産省登録
第22839号



■有効成分(一般名)ピラクロニル：5.0% プロピリスルフロン：2.25% ■人畜毒性：普通物*
*「普通物」とは毒物及び劇物に該当しないものを指している通称

特長

- 新規成分プロピリスルフロンとピラクロニルから成る、2成分の初・中期一発処理除草剤。
- 高葉令(3葉期)のノビエを始めSU抵抗性雑草、多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示す。
- 効果の発現が速く、長期間持続する。

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
移植水稲	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後5日～ ノビエ3葉期 ただし、 収穫60日前 まで	小包装(パック) 10個(400g) ／10a	2回以内	水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入れる	2回以内	2回以内
直播水稲	一年生雑草 及び ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ3葉期 ただし、 収穫60日前まで					

2020年11月末現在の登録内容



⚠ 使用上の注意事項

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に使用するよう注意してください。
- ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の使用適期です。
- 藻類または表層はく離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用してください。
- 苗の植え付けが均一になるように整地、代かきはていねいにを行い、ワラくすなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。
- 処理に当たっては、水の出入りを止めて5～6cmの湛水状態に保ってください。処理後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。自然減水により田面の一部が露出するようになつたら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じてください。
- 本剤は小包装(パック)のまま、10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
- 藻や浮き草が多発している水田では拡散が不十分となり、部分的な薬害や効果不足の可能性があるので使用をさけてください。
- 直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- バックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがな

- いように注意してください。
- 砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)、軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えの水田では、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。特に、処理時または処理後数日以内に異常高温が重なる場合は、初期生育の抑制が顕著になるので注意してください。
- 梅雨期等、処理後に多量の降雨が予想される場合には、除草効果が低下することがあるので使用をさけてください。
- 本剤は、移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用してください。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用の場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

★使用時にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★本剤は小児の手の届く所には置かないでください。★空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

