

かんきつの総合防除殺菌剤
ベフキノン[®]
水和剤

かんきつに適用拡大されました!

灰色かび病・そうか病・黒点病を同時防除!!

特長

1. 灰色かび病・そうか病・黒点病を同時防除。
2. 優れた予防効果。
3. 各種薬剤耐性菌に対しても有効。

ベフキノン[®]水和剤

有効成分 イミノクタジン酢酸塩 7%
8-ヒドロキシキノリン銅 50%
人畜毒性 医薬用外劇物
魚毒性 C類相当

■適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数	有機銅を含む 農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病 黒点病	1000	200～ 700ℓ	収穫30日 前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内
みかん	灰色かび病 そうか病 黒点病							
りんご	斑点落葉病	750～1000		収穫14日 前まで	3回以内		8回以内 （液剤及び水和剤は 合計6回以内(開花 期以降は3回以内)、 塗布剤は2回以内）	7回以内 （塗布は3回以内、 散布は4回以内）
	輪紋点病 すす病 すす斑病 褐斑病、炭疽病	1000						
なし	輪紋病 黒星病 黒斑病	1000		収穫45日 前まで	4回以内		5回以内 （塗布剤は2回以内、 液剤は1回以内）	12回以内 （塗布は3回以内、 散布は9回以内）
麦類 (小麦を除く)	雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病	300	100～ 200ℓ	根雪前	2回以内		3回以内 （種子への処理は1回 以内。 散布は2回以内。）	2回以内
小麦							4回以内 （種子への処理は1回 以内、散布及び無人 ヘリ散布は合計3回 以内、出穂期以降は 1回以内）	5回以内 （種子への処理は 1回以内）



△ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- ボルドー液、石灰硫黄合剤、水和硫黄剤との混用は避けてください。
- りんごに使用する場合は、落花後40日頃までは、さび果を生ずることがあるのでこの時期の散布は避けてください。また、樹勢の弱い場合に連続散布すると、生理落葉を助長することがあるので、連用は避けてください。特にゴールデン及びゴールデンからの育成品種には注意してください。
- なしに使用する場合は、展葉期の散布は葉害を生じるおそれがあるので、5月下旬までの散布は避けてください。
- 大豆、小豆、えんどうには、葉害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にはかからないように注意して散布してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



△ 安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。



△ 保管

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した所。カギをかけて保管する。盗難。紛失の際は警察に届ける。



△ ラベルをよく読む。△ 記載以外には使用しない。△ 小児の手の届く所には置かない。

取扱

JAグループ
農 協 全 農 経 済 連
登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本社 鹿児島市南栄2丁目9 ☎099-268-7588
九州北部営業所 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎0942-81-3808
宮崎事務所 宮崎市神宮東3丁目6-19 ☎0985-25-7051