



広範囲に使用可能、頼れる薬です

ベフドール[®]

水和剤



きゅうり, かぼちゃ, キャベツの病害を防除!!

特長

1. 幅広い抗菌スペクトラムを有します。
2. 優れた予防効果。
3. 各種薬剤耐性菌に対しても有効。



ベフドー®水和剤

登録番号 農林水産省登録 第21480号
有効成分 イミノクタジン酢酸塩 2.5%
塩基性塩化銅 73.5%(銅として44%)
人畜毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
包装 500g袋×20・1kg袋×20

■適用病害と使用方法 (一部抜粋)

(平成28年6月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	総使用回数		使用方法
					イミノクタジンを含む農薬	銅を含む農薬	
きゅうり	灰色かび病 炭疽病 斑点細菌病 べと病 うどんこ病 黒星病 褐斑病	500倍	収穫前日まで	3回以内	5回以内	—	散布
	菌核病	1,000倍					
かぼちゃ	うどんこ病 白斑病 疫病	500倍	収穫7日前まで	4回以内	4回以内		
キャベツ	黒腐病 べと病		収穫14日前まで	3回以内	3回以内		

■委託試験成績 (抜粋)

作物名	病害名	供試薬剤	希釈倍数	発病果率(%)	防除価	試験概要
きゅうり	菌核病	ベフドー水和剤	1,000倍	0.7	95.5	(社)日植防研究所(平6) 品 種 : トップグリーン 散布月日 : 3/15, 22, 28 調査月日 : 3/20~4/4 発生状況 : 中発生
		A水和剤	1,500倍	6.4	58.7	
		無散布	—	15.5	—	

作物名	病害名	供試薬剤	希釈倍数	発病果率(%)	発病度	試験概要
きゅうり	べと病	ベフドー水和剤	500倍	11.0	5.87	静岡県農業試験場(昭62) 品 種 : 北進 散布月日 : 10/17(開花期) 10/24(果実肥大期) 調査月日 : 11/10
		B水和剤	600倍	16.33	9.60	
		無処理	—	38.0	19.73	

△使用上の注意事項

- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- きゅうりに使用するには次の事項に注意してください。
 - ①薬害を生じやすいので幼苗期散布はさけて中期以降に散布してください。尚、高温時の散布は症状が激しくなることがあるのでさけてください。
 - ②連続散布は葉の周辺が黄化したり、硬化することがあるので、過度の連用はさけてください。
- キャベツに使用するには次の事項に注意してください。
 - ①結球開始期以降の散布で薬害を生じることがあるので注意してください。
 - ②炭酸カルシウム剤の所定量の添加は、薬害軽減に有効です。
- 石灰硫黄合剤、マシン油乳剤などとの混用はさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

△安全使用上の注意



- 取り扱いには十分注意してください。
 - 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
 - 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けさせてください。
- 粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 本剤は水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。
また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

★ラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★小児の手の届く所には置かないでください。

1606SA/BU10

