

果樹・野菜の害虫防除に

アディオ[®]

乳剤

作物いろいろワイドにまもる

ただいま
登録作物 **70種以上!**

適用拡大

害虫追加

「ブロッコリー」、「ねぎ」の
「ネキリムシ類」等

使用方法

「だいず」の「カメムシ類」に
「無人航空機による散布」等

※詳細は裏面でご確認ください。





サンケイ
アディオン[®] 乳剤

適用作物・害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法		
なし	アブラムシ類、シンクイムシ類 ハマキムシ類、カメムシ類	2,000～3,000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
もも	カメムシ類	2,000		収穫7日前まで	6回以内			
	モモハモグリガ	2,000～4,000						
	シンクイムシ類、アブラムシ類	2,000～3,000						
	ハマキムシ類	2,000～3,000						
かき	カキノヘタムシガ、カメムシ類、チャノキイロアザミウマ	2,000～3,000		2,000	5回以内			
	カキクダアザミウマ	2,000						
キウイフルーツ	キイロマイコガ	2,000～3,000		2,000	羽化脱出期但し 収穫14日前まで		6回以内	
	カメムシ類	2,000						
くり	クリタマバチ	1,000～2,000		2,000	収穫14日前まで		2回以内	
	クリシギゾウムシ	2,000						
かんきつ	ミカンハモグリガ、アブラムシ類	2,000～4,000		2,000～3,000	収穫7日前まで		3回以内	
	チャノキイロアザミウマ	2,000～3,000						
いちじく	アザミウマ類、アブラムシ類	3,000		2,000	収穫前日まで		2回以内	
	イチジクヒトリモドキ							3,000
アロニア	シンクイムシ類	2,000	2,000～3,000	収穫7日前まで	3回以内			
はまなす(果実)	キイロマイコガ					2,000		
ネクタリン	カメムシ類	2,000～3,000	2,000～4,000	収穫7日前まで	3回以内			
	シンクイムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類					2,000～3,000		
きゅうり	モモハモグリガ	2,000～4,000	オンシツコナジラミ、アブラムシ類、ウリハムシ	収穫前日まで	*1			
	ズッキーニ					アブラムシ類、フキノメイガ	2,000～3,000	
にがうり	カメムシ類、ヨトウムシ類、タバコカスミカメ	100～300ℓ/10a	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内			
すいか	アブラムシ類					5回以内		
メロン				3,000	2,000～3,000		収穫7日前まで	3回以内
かぼちゃ								
いちご				2,000	収穫7日前まで		3回以内	
ごぼう	ヨトウムシ			2,000				
だいず	フタスジヒメハムシ、マメハンミョウ、ツメクサガ ウコンノメイガ、カメムシ類、マメシンクイガ、アブラムシ類	3,000	0.8ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内			
	マメシンクイガ、アブラムシ類、カメムシ類	24						
うめ	アブラムシ類	3,000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
ピーマン	タバコガ、カメムシ類	2,000～3,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内			
	とうがらし類	2,000						
キャベツ	アブラムシ類	2,000～3,000	0.5ℓ/㎡	収穫21日前まで	*2	株元灌注		
	ネキリムシ類	4,000～8,000						
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ、タマナギンウワバ	2,000	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	5回以内	散布		
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ、ハクサイダニ			収穫7日前まで				
だいこん	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ ハイマダラノメイガ、ダイコンハムシ			収穫30日前まで				
かぶ	アブラムシ類	2,000～3,000		収穫前日まで	*3			
茎ブロッコリー	アオムシ	2,000						
ブロッコリー	コナガ	2,000～3,000		0.5ℓ/㎡	収穫7日前まで		5回以内	株元灌注
	アブラムシ類		2,000					
カリフラワー	ネキリムシ類	8,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	*4	散布		
	アブラムシ類	2,000						
レタス	アブラムシ類、ヨトウムシ	2,000～3,000		収穫3日前まで				
非結球レタス	アブラムシ類	3,000		収穫前日まで			3回以内	
トレビス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ネギコガ			5回以内				
たまねぎ	アザミウマ類、ネギコガ			2,000				
ねぎ	シロイチモジヨトウ	2,000	0.5～1ℓ/㎡	収穫7日前まで	3回以内	株元灌注		
	ネキリムシ類	4,000～8,000						
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	2,000～3,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	*4	散布		
	アブラムシ類	32～48倍	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布		

2024年6月現在の登録内容(太字は2024年5月29日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
ハスカップ	ハマキムシ類、アブラムシ類	2,000～3,000	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	
アスパラガス	ジウシホシクビナガハムシ、カメムシ類 ヨトウムシ、アブラムシ類	2,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内		
さやいんげん	カメムシ類	3,000		収穫14日前まで			2回以内
未成熟そらまめ	アザミウマ類、アブラムシ類 ハモグリバエ類、ヨトウムシ類 ウラナミシジミ、アズキノメイガ マメシンクイガ			収穫7日前まで			
豆類 〔未成熟、但し、 さやいんげん、 さやえんどう、 未成熟そらまめ、 えだまめを除く〕				収穫14日前まで			*5
えだまめ				収穫前日まで	3回以内		
さやえんどう				ナモグリバエ、ヨトウムシ類 ウラナミシジミ			収穫前日まで
ほうれんそう しゅんぎく		アブラムシ類、ハクサイダニ		4,000	収穫14日前まで 収穫21日前まで		4回以内
しそ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類 アザミウマ類、コナジラミ類 ウリハムシモドキ	2,000		収穫前日まで	5回以内		
オクラ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、カメムシ類	2,000		100～300ℓ/10a			収穫前日まで
トマト ミニトマト	オンシツコナジラミ、アブラムシ類	2,000			収穫前日まで		3回以内
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ、カメムシ類 テントウムシダマシ類	2,000			収穫14日前まで		
なばな類 ばれいしょ	コナガ、アオムシ アブラムシ類、テントウムシダマシ類	2,000			収穫7日前まで		3回以内
とうもろこし	アワノメイガ アブラムシ類	2,000 2,000			収穫14日前まで		
あずき	アズキノメイガ アブラムシ類	2,000 2,000			収穫7日前まで		3回以内
やまのいも	アブラムシ類、アザミウマ類、ヤマノイモコガ	2,000			収穫7日前まで		
さといも	ハスモンヨトウ アブラムシ類、スズメガ類	2,000 2,000			収穫7日前まで		3回以内
さといも(葉柄)	ハスモンヨトウ アブラムシ類	2,000 3,000	収穫7日前まで		3回以内		
かんしょ	イモコガ	2,000	収穫7日前まで				3回以内
茶	チャノコカクモンハマキ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ、チャノキイロアザミウマ	2,000 2,000	200～400ℓ/10a		摘採14日前まで		
そらまめ	アブラムシ類	3,000	200～400ℓ/10a		摘採14日前まで		3回以内
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、非結球はくさい、 みずな、なばな類を除く)	アオムシ	2,000	100～300ℓ/10a		収穫7日前まで		
こまつな	ハクサイダニ	2,000			収穫7日前まで		3回以内
非結球はくさい	アオムシ	2,000			収穫7日前まで		
みずな	アブラムシ類、ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ	2,000			収穫7日前まで		3回以内
つるむらさき	アオムシ	2,000		収穫7日前まで	3回以内		
食用ゆり	ヨトウムシ	2,000		収穫7日前まで			3回以内
食用亜麻	アブラムシ類	3,000		収穫7日前まで	3回以内		
葉ごぼう	アオムシ	2,000		収穫7日前まで			3回以内
ごま	アブラムシ類	3,000		収穫7日前まで	3回以内		
はこべ	アブラムシ類、カメムシ類	2,000		収穫7日前まで			3回以内
花き類・観葉植物 (はばたんを除く)	オオタバコガ	3,000		200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		
はばたん	アブラムシ類	2,000		200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内
樹木類(くちなしを除く)	アブラムシ類	2,000		200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		
くちなし	アブラムシ類	2,000		200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000		200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000		200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで			3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで			3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで			3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで			3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで			3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで			3回以内
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	
アザミウマ類	アブラムシ類	2,000	200～400ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		

*印は本剤及びペルメトリンを含む農薬の総使用回数
*1:本剤は3回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) *2:本剤は5回以内(株元灌注は2回以内)、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は5回以内(株元灌注は2回以内)
*3:本剤は2回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(散布は2回以内) *4:本剤は2回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) *5:本剤は3回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内)



サンケイ

アディオン[®] 乳剤

果樹・野菜の害虫防除に

農林水産省登録 第15960号 [有効成分] ペルメトリン…20.0%

殺虫剤分類 3A

使用上の注意事項(抜粋)



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- かんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
- みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、無人航空機散布の注意を守ってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、薬液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は、農薬用マスク、手袋などを着用してください。また、薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。

● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

2406SC/DA



JAグループ

農 協

全 農

経済連

全農は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本 社 鹿児島市南栄2丁目9 ☎099-268-7588

九州北部営業所 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎050-3508-7912

宮崎事務所 宮崎市神宮東3丁目6-19 ☎0985-25-7051