

# ガードベイト® A

## ペルメトリン粒剤

### 特徴

- ◎ネキリムシを誘引し、摂食させることで効果を発揮するベイト剤です。
- ◎成分は合成ピレスロイドなので、優れた殺虫・被害防止効果があります。
- ◎赤色の粒剤ですので、散布したところがよくわかります。



ネキリムシ

## ネキリムシから大切な作物を守る!!



ガードベイトAの形状



### サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学(株)の登録商標

# ガードバイト® A

農林水産省登録 第20919号  
 有効成分:ペルメトリン 0.1% 包装: 2kg×8  
 性状:淡赤色粒状  
 毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)  
 殺虫剤分類 3A

## 適用病害虫名および使用方法


2022年8月30日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む農薬の総使用回数	
はくさい、ごぼう	ネキリムシ類	3kg/10a	は種時～生育初期	5回以内	株元散布	5回以内	
だいこん				4回以内		4回以内	
キャベツ			生育初期	5回以内		5回以内	
レタス、ブロッコリー カリフラワー、かぼちゃ いちご、たまねぎ かんしょ、やまのいも ピーマン、さといも				5回以内		5回以内	
たかな				生育初期 但し収穫14日前まで		2回以内	5回以内 (乳剤は3回以内、粒剤は2回以内)
非結球レタス						2回以内	4回以内 (乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)
ミニトマト				生育初期		1回	4回以内 (株元散布は1回以内、 散布及び噴射は合計3回以内)
かぶ			収穫3日前まで	4回以内		4回以内 (散布は2回以内)	
にら にら(花莖)				3回以内		3回以内	
にんじん			生育初期 但し収穫7日前まで	5回以内		5回以内	
ほうれんそう しゅんぎく			生育初期	2回以内		2回以内	
ズッキーニ			生育初期 但し収穫開始7日前まで	3回以内		6回以内 (乳剤は3回以内、粒剤は3回以内)	
とうもろこし ばれいしよ			生育初期	4回以内		4回以内	
なす、トマト、ねぎ、わけぎ あさつき、そらまめ、だいず きゅうり、なばな類 豆類(未成熟)				3回以内		3回以内	
オクラ			は種時～生育初期	3回以内		3回以内	
らっかせい			収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
とうがらし類			収穫前日まで	2回以内		2回以内	
しそ			生育初期 但し収穫90日前まで	4回以内		4回以内 (乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)	
にんにく							
しょうが			定植時～発芽期 但し収穫120日前まで	4回以内		4回以内	
葉しょうが			生育初期 但し収穫30日前まで				
アスパラガス、パセリ			収穫前日まで	3回以内		3回以内	
はっか				2回以内		2回以内	
エンダイブ			定植時 但し収穫21日前まで	3回以内		3回以内	
もりあざみ			生育初期 但し収穫7日前まで	2回以内		2回以内	
エンサイ			生育初期 但し収穫14日前まで	4回以内		4回以内	
飼料用とうもろこし (青刈り) ヤングコーン							
びゃくし			収穫90日前まで	3回以内		3回以内	
いんちんこう			収穫30日前まで				
食用おぼこ(種子)			収穫7日前まで	6回以内		6回以内	
花き類・観葉植物	生育初期						
たばこ	定植時	1回	1回				

### ⚠ 使用上の注意事項

- 作物体上から作物の地際の表面に散布してください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかけないようご注意ください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 誤食などのないようご注意ください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際はマスク、手袋などをしてください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験でメトカルパモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。
- 直射日光を避け、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

### 〈上手な使い方〉



混和せずに、土壌表面の作物の株元に散布しましょう。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-GBA2022.09K

取扱い



全農 は登録商標 第4702318号



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 ☎(099) 268-7588  
 九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市首根崎町1154-3 ☎(0942) 81-3808  
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 ☎(0985) 25-7051