

# ガードベイト®A

## ペルメトリン粒剤

### 特長

- ◎ネキリムシを誘引し、摂食させることで効果を発揮するベイト剤です。
- ◎成分は合成ピレスロイドなので、優れた殺虫・被害防止効果があります。
- ◎赤色の粒剤ですので、散布したところがよくわかります。



## ネキリムシから 大切な作物を守る!!



ガードベイトAの形状

製品情報・SDSは  
こちら

## サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学(株)の登録商標

# ガードベイト® A

農林水産省登録 第20919号  
有効成分:ペルメトリン 0.1% 包装: 2kg×8  
性状:淡赤色粒状  
毒性:普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)  
殺虫剤分類 3A

## 適用病害虫名および使用方法

2024年8月7日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量 (10a 当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む 農薬の総使用回数
はくさい	ネキリムシ類	3kg	は種時～生育初期	5回以内	株元散布	5回以内
ごぼう			は種後～発芽前		土壤表面散布	
だいこん			は種時～生育初期	4回以内		4回以内
オクラ				3回以内		3回以内
キャベツ				5回以内		5回以内 (株元灌注は2回以内)
レタス、ブロッコリー カリフラワー				3回以内		5回以内
なす、トマト				1回		3回以内
ミニトマト				5回以内		4回以内 (株元散布は1回以内、 散布及び噴射は合計3回以内)
ピーマン、いちご			定植前	3回以内		5回以内
たまねぎ			生育初期	1回		
かんしょ			植付前	土壤表面散布		
やまのいも				5回以内		
さといも				4回以内		4回以内
とうもろこし、ばれいしょ				3回以内		3回以内
なばな類、ねぎ、わけぎ あさつき、豆類(未成熟) そらまめ、だいず、きゅうり				5回以内		5回以内
かぼちゃ				4回以内		5回以内
ほうれんそう、しゅんぎく				3回以内		2回以内
たかな				5回以内		5回以内(乳剤は3回以内、 粒剤は2回以内)
非結球レタス			生育初期 但し 収穫14日前まで	2回以内		4回以内(乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内)
ズッキーニ				3回以内		6回以内(乳剤は3回以内、 粒剤は3回以内)
にんじん			生育初期 但し 収穫開始7日前まで	1回		5回以内
もりあざみ			生育初期 但し 収穫7日前まで	2回以内		3回以内
エンサイ				3回以内		2回以内
飼料用とうもろこし (青刈り)			生育初期 但し 収穫14日前まで	4回以内		
ヤングコーン			生育初期 但し 収穫30日前まで	2回以内		4回以内
葉しょうが			定植時～発芽期 但し 収穫120日前まで	4回以内		
しょうが			定植時 但し 収穫21日前まで	3回以内		2回以内
エンダイブ			生育初期 但し 収穫90日前まで	2回以内		4回以内(乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内)
にんにく			収穫3日前まで	4回以内		4回以内(散布は2回以内)
かぶ				3回以内		3回以内
にら、にら(花茎)			収穫前日まで	2回以内		2回以内
アスパラガス、パセリ				3回以内		4回以内(乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内)
はっか			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
しそ			収穫30日前まで	3回以内		3回以内
とうがらし類			収穫90日前まで	4回以内		4回以内
食用おおばこ(種子)			生育初期	6回以内		6回以内
らっかせい			定植時	1回		1回
いんちんこう						
びゃくし						
花き類・観葉植物						
たばこ						

### △ 使用上の注意事項

- 作物体上から作物の地際の表面に散布してください。
- みずかけな(水掛け)、カラー及び花はすに使用する場合は、は場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 虫に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかかるないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。


### △ 安全使用上の注意事項

- 誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際は、マスク、手袋などをしてください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

### △ 貯蔵上の注意事項

- 直射日光を避け、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

### △ 上手な使い方



混和せずに、株元散布もしくは土壤表面散布でお使いください。  
使用にあたっては上記適用表を確認の上お使いください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-GBA2024.08K

取扱い

JAグループ  
農協 | 全農 | 経済連

JA農業生産者登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 ☎(099) 268-7588  
九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎(050) 3508-7912  
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 ☎(0985) 25-7051