

サンケイ **ダースバイン** TM 粒剤



かんしょの 土壌害虫防除に！


特長

適用範囲が広い

コガネムシ類、ハリガネムシ類、ゾウムシ類等の
難防除土壌害虫に有効です。

残効性に優れる

比較的残効性が長いので、
安定した防除効果が期待できます。



■適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使 用 量	使用時期	本 剤 及 び クロルピリホスを含む 農薬の総使用回数	使用方法
かんしょ	ハリガネムシ類	9kg	植 付 時	2回以内	全面土壌混和 又は 植溝土壌混和
	コガネムシ類幼虫		生 育 期 (但し、収穫 30日前まで)		全 面 散 布
	アリモドキゾウムシ イモゾウムシ	6kg			株 元 散 布
さとうきび	ハリガネムシ類	9kg	植 付 時	1 回	植溝土壌混和

⚠ ラベルをよく読む ⚠ 記載以外には使用しない ⚠ 小児の手の届く所には置かない

TM：ダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標



サンケイ化学株式会社

サンケイ ダーズバンTM 粒剤

■農林水産省登録 第19621号

- 人畜毒性：劇物
- 有効成分名および含有量
クロルピリホス……3.0%
(PRTR・1種249)

試験成績

■コガネムシ類に対する防除効果（平成7年度）

鹿児島農試 大隅支場

供試薬剤	10アール当たり 使用量	処理方法	調査 いも数	被害 いも数	被害 いも率	被害度	葉害
ダーズバン粒剤	9 kg	植溝処理	52.7	6.0	11.4%	9.1	—
A 粒 剤	9 kg	植溝処理	62.3	10.0	16.1%	11.6	—
無 処 理	—	—	56.3	10.0	17.8%	15.0	—

- 植付時植溝混和処理
- 1区 25.6㎡ 3区制
- 5月19日処理
- 9月27日 各区から15株を
掘取り50g以上のいもについて
被害程度別に調査

■ハリガネムシ類に対する防除効果（平成7年度）

宮崎総合農試

供試薬剤	10アール当たり 処 理 量	調査 株数	調査 いも数	被害 株数	被害 いも数	被害 株率	被害 いも率	食害 程度	葉害
ダーズバン粒剤	9 kg	20.0	91.5	8.5	13.0	42.5%	14.2%	0.2	—
無 処 理	—	20.0	90.0	20.0	42.0	100%	46.7%	1.12	—

- 植付前全面混和処理
- 1区 40㎡ 2連制
- 6月2日処理
- 収穫時(10月17日)各区とも20株を選び
被害株率、被害いも率、被害痕数を調査

■県植防展示試験概要（平成8年度）

◎:対象薬剤にやや優る ○:対象薬剤に同等

作物名	対象害虫名	県名	展 示 機 関 名 (展示場所)	10アール当たり 使 用 量	処理方法	調 査 成 績			効 果
						区 名	被害いも率	被害度	
かんしょ	コガネムシ類幼虫	鹿児島	吹上農業改良普及所 (吹上町入来)	9 kg 〔処理月日 4月30日〕 〔調査月日 9月17日〕	植溝施用後 作畦	ダーズバン粒剤 A 粒 剤 9kg B 粒 剤 9kg 無 処 理	9.3 16.4 18.2 19.6	4.0 5.7 6.7 10.0	○～◎
			鹿屋農業改良普及所 (鹿屋市野里町)	9 kg 〔処理月日 5月25日〕	植溝施用後 作畦	ダーズバン粒剤 C 粒 剤 9kg 無 処 理	6.0 10.0 40.5	2.0 3.3 20.6	○
		宮 崎	宮崎県農業大学校 (校内普及畑No.25)	9 kg 〔処理月日 6月 1日〕 〔調査月日 10月16日〕	土壌全面施用後 耕起マルチ	ダーズバン粒剤 B 粒 剤 9kg 無 処 理	0.0 4.2 38.9		◎
			南那珂農業改良普及 センター	9 kg 〔処理月日 4月19日〕 〔調査月日 10月22日〕	土壌全面施用後 耕起マルチ	ダーズバン粒剤 D 粒 剤 30kg C 粒 剤 9kg E 微 F 9kg F ソル + G 粉 2+6	2.7 15.6 0.0 8.6 0.0		○
	ハリガネムシ類幼虫	鹿児島	指宿農業改良普及所 (山川町浜児ヶ水)	9 kg 〔処理月日 5月 7日〕 〔調査月日 9月28日〕	植溝施用後 作畦	ダーズバン粒剤 C 粒 剤 9kg	0.0 1.9	0.0 0.6	○
			大隅農業改良普及所 (輝北町柏木)	9 kg 〔処理月日 5月30日〕 〔調査月日 9月20日〕	植溝施用後 作畦	ダーズバン粒剤 A 粒 剤 9kg 無 処 理	1.9 2.1 100	0.6 0.6 59.2	○
		宮 崎	宮崎県農業大学校 (校内普及畑No.25)	9 kg 〔処理月日 6月 1日〕 〔調査月日 10月16日〕	土壌全面施用後 耕起マルチ	ダーズバン粒剤 B 粒 剤 9kg 無 処 理	0.0 16.7 52.4		◎
			南那珂農業改良普及 センター	9 kg 〔処理月日 4月19日〕 〔調査月日 10月16日〕	土壌全面施用後 耕起マルチ	ダーズバン粒剤 D 粒 剤 30kg C 粒 剤 9kg E 微 F 9kg F ソル + G 粉 2+6	0.0 15.6 22.2 8.6 0.0		◎

■使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
- 植付時に全面処理、植溝処理または条作処理し、土壌中に均一に分布するようによく混和してください。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

■安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されています。
- 使用の際には農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

■水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

