

果樹の害虫防除に!!

ネオニコチノイド系殺虫剤

ダントツリ[®] 水溶剤

ダントツは住友化学(株)の登録商標



等の主要害虫を
幅広く防除!



これ1本(125g)で
500倍分
(4000倍)



すももの
クビアカツヤカミキリに
適用拡大!!



ユキヤナギアブラムシ チャノキイロアザミウマ チャバネアオカメムシ フジコナカイガラムシ ゴマダラカミキリ キンモンホソガ モモシンクイワ カキノヘタムシガ オウツヨウジョウバエ

りんご・もも・ぶどう・なし・うめ・かんきつ・ かき・おうとう等の害虫防除に!!

農林水産省登録
第20798号

ダントツ効くから
ダンゼンおトク!

ダントツリ
水溶剤

有効成分：クロチアニジン…16.0%

特長

- ① 果樹の主要害虫を幅広く防除することができます。
- ② カメムシ類に対して速効的な殺虫力と吸汁抑制効果が期待できます。
- ③ かんきつ・りんご・ぶどう・なし・うめ・おうとうは収穫前日、もも・かき・マンゴーは収穫7日前まで使えます。
- ④ 優れた防除効果が長期間持続します。
- ⑤ 粉立ちが少なく溶けやすい顆粒状の水溶剤です。

希釈 早見表	希釈倍数 水量	2000倍		4000倍	
		10g	5g	25g	12.5g
25g 計量→ キャップ	20ℓ				
ポトル→	100ℓ				
	500ℓ				

4000倍の場合、125gポトル1本で500ℓの薬液ができます。

⚠ 使用上の注意事項(抜粋) ⚡

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- かんきつには樹幹散布で使用する場合は、樹幹部から地際部に十分量を散布または塗布してください。また、散布液が葉にかかると薬害を生じるおそれがあるので、葉にかかるないように十分に注意してください。
- ぶどうに使用する場合、袋かけ前までの幼果期に散布すると品種によっては果粉が溶脱するおそれがあるので注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

■適用害虫と使用方法

2021年9月現在の登録内容(太字は2021年8月25日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
りんご	カメムシ類、キンモンホソガ ギンモンハモグリガ シンクイムシ類、アブラムシ類 コナカイガラムシ類 リンゴワタムシ、ケムシ類 コガネムシ類成虫	2000~4000		収穫前日まで		
もも	コガネムシ類、クビアカツヤカミキリ アブラムシ類、モモハモグリガ	2000 2000~		収穫7日前まで		
ネクタリン	シンクイムシ類、カメムシ類 コガネムシ類	4000 2000		収穫3日前まで		
ぶどう	コナカイガラムシ類 チャノキヨロアザミウマ フタテヒメヨコバイ ブドウラカミキリ カメムシ類、コガネムシ類	2000~4000		収穫前日まで		
なし	チュウゴクナシキジラミ シンクイムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類、ケムシ類	200~700 ℓ/10a		200~700 ℓ/10a	3回以内	散布
うめ	アブラムシ類	2000				
あんず	アブラムシ類	4000				
すもも	クビアカツヤカミキリ アブラムシ類、カメムシ類	2000				
かんきつ	アブラムシ類、アザミウマ類 ツノロウムシ アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ、ケシキスイ類 コアオハナムグリ カメムシ類、アゲハ類 ミカンハモグリガ、ミカンバエ コナジラミ類、ミカンキジラミ アオバハゴロモ カネタタキ	2000~4000		収穫前日まで		
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ ミカンキジラミ	20 40	100mℓ/樹 200mℓ/樹	収穫150日前まで		
さんしょ(果実)	ゴマダラカミキリ、ミカンハモグリガ アゲハ類、アブラムシ類	20	10~100 mℓ/樹	春芽・夏芽又は秋芽の発生前		
かき	アザミウマ類	4000		収穫前日まで	2回以内	
びわ	アザミウマ類、コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ、カメムシ類 カキノヘヨコバイ	2000~4000		収穫7日前まで		
いちじく	カキリムシ類	2000		収穫前日まで	3回以内	散布
マンゴー	アザミウマ類	2000~4000		収穫3日前まで		
キウイフルーツ	カキムシ類、キウイヒメヨコバイ アオバハゴロモ	2000~4000		収穫前日まで		
パイナップル(苗木)	パイナップルコナカイガラムシ	—		植付前	1回	10秒間苗浸漬
パパイヤ	ナガカタカイガラムシ ヒラタカタカイガラムシ	2000		収穫3日前まで	3回以内	
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2000~700 ℓ/10a		収穫前日まで	2回以内	
ブルーベリー	アブラムシ類 ケムシ類、オウトウショウジョウバエ	2000~4000		収穫45日前まで	3回以内	
オリーブ	カメムシ類 オリーブアナキゾウムシ マエアカスカシノメイガ	2000~4000		収穫前日まで	2回以内	
なづめ	ゴマダラカミキリ	4000		収穫120日前まで		
				収穫7日前まで	3回以内	

ダントツ水溶剤は、他作物にも登録があります。詳細はラベルをご確認ください。

●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

- ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかかるないようにしてください。
- ②授粉促進を目的としてミツバチ等を放糞中の施設や果樹園等では使用をさせてください。
- ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ④マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- ⑤本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ⑥眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼

に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。

- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に關係のない者が使用区域に立ち入らないよう繩囲いや立て札を立てなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管線に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

この印刷物の記載内容は2021年9月現在のものです。