


すぐ効く、よく効く、ながく効く



農業用殺虫剤



# トレボン<sup>®</sup>粉剤DL

有効成分：エトフェンプロックス……0.50%

トレボンは三井化学アグロ株式会社の登録商標です。



水稻のウンカ・ヨコバイ類を始め、ドロオイ、カメムシ、イナゴなど主要害虫に速効的で強力な効果。さらにだいこん、えだまめ、あずき、とうもろこし、かんしょ、キャベツ、小麦、やまのいも、きゅうり、はくさい、だいこん、さといも、れんこんに登録があります。

# 農業用殺虫剤



# トレボン<sup>®</sup>粉剤DL

人畜毒性:普通物\*

\*「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

農林水産省登録  
第17169号

## 特長

- ①水稻のウンカ・ヨコバイ類に優れた効果
- ②優れた速効性と残効性
- ③抵抗性害虫にも有効
- ④幅広い作物の害虫にも有効

## ■適用害虫および使用方法

(平成26年7月23日付拡大登録内容を含む)

| 作物名                  | 適用場所 | 適用害虫名        | 使用量<br>(kg/10a) | 使用時期     | 本剤およびエトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 | 使用方法 |  |
|----------------------|------|--------------|-----------------|----------|----------------------------|------|--|
| 稻                    | 一    | イネツトムシ       | 4               | 収穫7日前まで  | 3回以内                       | 散布   |  |
|                      |      | カメムシ類        |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | イネミズゾウムシ成虫   |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | ツマグロヨコバイ     |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | ウンカ類         |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | コブノメイガ       | 3~4             |          |                            |      |  |
|                      |      | アザミウマ類       |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | イナゴ類         |                 |          |                            |      |  |
|                      | ※    | イネドロオイムシ     |                 | —        | —                          |      |  |
|                      |      | ニカメイチュウ      |                 |          |                            |      |  |
| 水田作物<br>畑作物<br>(休耕田) | ※    | イネヒメハモグリバエ   | 3               | —        | —                          |      |  |
|                      |      | フタオビコヤガ      |                 |          |                            |      |  |
| 小麦                   | きゅうり | ヒメトイウンカ      | 4               | 収穫14日前まで | 2回以内                       |      |  |
| きゅうり                 |      | アブラムシ類       |                 | 3~4      | 3回以内                       |      |  |
| はくさい                 |      | ウリハムシ        |                 |          |                            |      |  |
| だいこん                 |      | アオムシ         |                 | 収穫7日前まで  |                            |      |  |
| 豆類<br>(種実)           | 一    | ハスモンヨトウ      | 4               | 収穫21日前まで |                            |      |  |
|                      |      | マメシンクイガ      |                 | 収穫14日前まで | 2回以内                       |      |  |
|                      |      | シロイチモジマダラメイガ |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | カメムシ類        |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | フタスジヒメハムシ    |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | ダイズサヤタマバエ    |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | アブラムシ類       |                 |          |                            |      |  |
| えだまめ                 | 一    | アズキノメイガ      |                 | 4        | 2回以内                       |      |  |
|                      |      | ハスモンヨトウ      | 3~4             |          |                            |      |  |
|                      |      | マメシンクイガ      |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | シロイチモジマダラメイガ |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | カメムシ類        |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | フタスジヒメハムシ    |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | ダイズサヤタマバエ    |                 |          |                            |      |  |
| れんこん                 | さといも | マメコガネ        |                 | 4        | 3回以内                       |      |  |
| やまのいも                |      | シロイチモジヨトウ    |                 |          |                            |      |  |
| さといも                 |      | ハスモンヨトウ      |                 |          |                            |      |  |
| かんしょ                 |      | ハスモンヨトウ      |                 |          |                            |      |  |
| とうもろこし               | キャベツ | ナカジロシタバ      |                 | 4        | 4回以内                       |      |  |
| キャベツ                 |      | アワノメイガ       |                 |          |                            |      |  |
|                      |      | ハスモンヨトウ      | 3~4             |          |                            |      |  |
|                      |      | アブラムシ類       |                 | 3回以内     | 3回以内                       |      |  |
|                      |      | アオムシ         |                 |          |                            |      |  |

\*ヨシ、オギ、スキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記帳しましょう。

\*本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。  
\*本印刷物は平成26年7月23日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。



J.A. Group  
農 協 | 全 農 | 経済連

全農は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

鹿児島本社:鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9 電話:099-268-7588  
九州北部営業所:佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 電話:0943-81-3808  
宮崎事務所:宮崎県宮崎市神宮東3丁目6番19号 山本ビル 電話:0985-25-7051