水稲のウンカ・ヨコバイ類を始め、ドロオイ、カメムシ、イナゴなど主要害虫に速効的で強力な効果。さらに豆類（種実）、えだまめ、とうもろこし、飼料用とうもろこし（子実）、かんしょ、キャベツ、小麦、やまのいも、きゅうり、すいか、かぼちゃ、なす、はくさい、だいこん、ばれいしょ、さといも、れんこん、トマト、オクラに登録があります。



すぐ効く、よく効く、ながく効く

農業用殺虫剤

トレボン®粉剤DL

有効成分：エトフェンプロックス……0.50%

トレボンは三井化学クロップ&ライフソリューション（株）の登録商標です。

ツマグロヨコバイ

トビイロウンカ

セジロウンカ

ヒメトビウンカ

イネドロオイムシ

イネミズゾウムシ

イナゴ類

カメムシ類

ウリハムシ

アオムシ

農業用殺虫剤

サンケイ トレボン® 粉剤DL

農林水産省登録
第16756号
殺虫剤分類 3A

人畜毒性：普通物*
*「毒物および劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

■適用害虫および使用方法

（2024年7月1日現在の登録内容）

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量（kg/10a）	使用時期	本剤およびエトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	—	イネツトムシ	4	収穫7日前まで	3回以内	散布
		カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ アザミウマ類 イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ	3～4			
		イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ	3			
水田作物 畑作物 （休耕田）	※	カメムシ類	3～4	—		
小麦	—	ヒメトビウンカ アブラムシ類	4	収穫14日前まで	2回以内	
すいか		ハスモンヨトウ ウリハムシ		収穫3日前まで	3回以内	
かぼちゃ		コナジラミ類		収穫前日まで		
きゅうり		アブラムシ類				
		ウリハムシ	3～4			
なす		テントウムシダマシ類	4			
トマト		コナジラミ類			2回以内	
オクラ		アブラムシ類			3回以内	
はくさい		コナガ		収穫7日前まで		
だいこん		アオムシ	3～4	収穫21日前まで		
		ダイコンハムシ	4			
豆類 （種実）		ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 アズキノメイガ		収穫14日前まで	2回以内	
えだまめ		ハスモンヨトウ	3～4			
		マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	4			
れんこん		マメコガネ			3回以内	
やまのいも		シロイチモジヨトウ				
さといも		ハスモンヨトウ				
かんしょ		ナカジロシタバ		収穫7日前まで		
ばれいしょ		テントウムシダマシ類				
とうもろこし		アワノメイガ			4回以内	
飼料用とうもろこし（子実）						
キャベツ		ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ	3～4	収穫3日前まで	3回以内	

※ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

特長

❶水稲のウンカ類・ヨコバイ類に優れた効果

❷優れた速効性と残効性

❸抵抗性害虫にも有効

❹幅広い作物の害虫にも有効

⚠ 使用上の注意事項

①水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。
②散布後は水管理に注意してください。
③散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
④本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布してください。
⑤イネミズゾウムシ成虫に使用する場合、移動範囲が広いのでなるべく広域でいっせいに防除し、畦畔などの周辺雑草にも散布してください。
⑥本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
⑦誤食などのないよう注意してください。
⑧本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
⑨散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
⑩作業後は手足、顔等を石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
⑪蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
⑫散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
⑬ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

万一、誤食・誤飲した場合には、速やかに医師の手当を受けてください。皮膚などにかかった場合には、十分な水で洗い流してください。さらに、異常を感じた場合は、医師の手当を受けてください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記帳しましょう。

*本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
*本印刷物は2024年7月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

JAグループ
農協 | 全農 | 経済連
全農は登録商標 第4702318号

サンケイ化学株式会社
本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9番地 ☎099-268-7588(代)
九州北部営業所 〒841-0025 鳥栖市曽根崎町1154-3 ☎050-3508-7912
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3丁目6-19(山本ビル) ☎0985-25-7051