



だいず、かんしょ、ばれいしょ、
キャベツ、ブロッコリーには
無人航空機での散布も可能です!



野菜・豆・花きの害虫防除に

適用作物充実!!

各種
適用拡大!
詳細は裏面
ご確認ください。



おかげさまで20周年

天敵にやさしく。害虫にキビシイ!

プレオフロアブル®





野菜・豆・花きの害虫防除に

プレオプロアブル

殺虫剤分類 UN 有効成分：ピリダリル…10.0%

農林水産省登録 第21333号

特長

- 1 ユニークな作用性
2 優れた殺虫活性と残効性
3 天敵・有用昆虫に対する影響が少ない

【適用作物・害虫と使用方法】

2024年5月現在の登録内容(太字は2024年4月24日適用拡大)

Table with columns: 作物名, 適用害虫名, 希釈倍数, 10a当り使用液量, 使用時期, 本剤の使用回数及びピリダリルを含む農薬の総使用回数, 使用方法. Rows include various crops likeキャベツ, トマト, とうもろこし, etc.

【使用上の注意】(抜粋)

- 使用前によく振ってください。
●散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
●蜜に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないように注意してください。
●本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
①散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
②無人航空機による散布にあつては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
④特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
⑤散布終了後は次の事項を守ってください。
a) 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
b) 使用残りの薬液は必ず安全な場所に責任者をさめて保管してください。
c) 機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
●非結球レタスには品種によっては薬害を生じるおそれがあるのであらかじめ薬害のないことを確かめたうえで使用してください。
●せり、みずかけな(水掛葉)、カラー及びひなはずに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
●皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
●散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
●ラベルの記載以外には使用しないでください。
●小児の手の届く所には置かないでください。
●空袋・空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。

※収穫3日前まで 但し、みづかの伏せ込み栽培は伏せ込み前まで



JAグループ

農協

全農

経済連

登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本社 鹿児島市南栄2丁目9 ☎099-268-7588
九州北部営業所 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎050-3508-7912
宮崎事務所 宮崎市神宮東3丁目6-19 ☎0985-25-7051