

～使ってベスト! しっかりガード!～

殺虫剤

ベストガード[®]粒剤

アブラムシ・コナジラミ・アザミウマ
などの難防除害虫に



アブラムシ類 (ワタアブラムシ)



タバココナジラミ



ミナミキイロアザミウマ



マメハモグリバエ

幅広い時期(は種時、鉢上げ時、育苗期、定植時)に
使用できるようになりました!!

※トマト・ミニトマト・なす・きゅうりのアブラムシ類

適用拡大 ●いちご(チバクロバネキノコバエ) 等

は種時または鉢上げ時に!! 〈育苗培土混和〉

なす、トマト、ミニトマト、きゅうり など

育苗期に!! 〈株元に処理〉

なす、トマト、ミニトマト、きゅうり、
レタス など

定植時に!! 〈植穴に処理〉

なす、トマト、ミニトマト、きゅうり、
すいか、ピーマン、ブロッコリー など

生育期に!! 〈株元に処理〉

なす、しゅんぎく、
いちご、花き類 など



特長

- 長期間効果が持続
- 作物への安全性が高い
- いやな臭いが無い



3kg袋もあります

■適用と使用方法

2022年6月現在の登録内容(太字は2022年6月8日適用拡大)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数	使用方法
きゅうり	コナジラミ類、アブラムシ類、アザミウマ類	5g/培土ℓ	は種時 鉢上げ時	1回	※②	育苗培土混和
	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	育苗期			株元処理
	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類	1～2g/株	定植時			植穴処理土壌混和
なす	アブラムシ類	5g/培土ℓ	は種時又は鉢上げ時	1回	※②	育苗培土混和
	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	育苗期			株元処理
	※①	※①	育苗期後半			散布
	アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ	1～2g/株	定植時			植穴処理土壌混和
トマト ミニトマト	アブラムシ類	2g/株	収穫前日まで	3回以内	※②	生育期株元散布
	アブラムシ類、コナジラミ類	5g/培土ℓ	は種時又は鉢上げ時			育苗培土混和
	アブラムシ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類	1～2g/株	育苗期			株元処理
	アブラムシ類、コナジラミ類	※①	育苗期後半			散布
すいか	アブラムシ類、コナジラミ類	1～2g/株	定植時	1回	※②	植穴処理土壌混和
	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	育苗期			株元処理
ピーマン	アブラムシ類、コナジラミ類	1～2g/株	定植時	1回	※②	植穴処理土壌混和
	コナジラミ類	1g/株	育苗期			株元処理
ししとう	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	※②	植穴処理土壌混和
	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	定植時			株元処理
とうがらし類(ししとうを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	※②	植穴処理土壌混和
	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	定植時			株元処理
メロン	アブラムシ類、コナジラミ類	1～2g/株	定植時	1回	※②	植穴処理土壌混和
	ミナミキイロアザミウマ	1～2g/株	定植時			植穴処理土壌混和
ズッキーニ うり類(漬物用)	アザミウマ類	1～2g/株	定植時	1回	1回	植穴処理土壌混和
	アブラムシ類	1～2g/株	定植時			植穴処理土壌混和
いちご	チバクロバネキノコバエ	1～2g/株	収穫前日まで	3回以内	※③	生育期株元散布
	アブラムシ類	1g/株	定植時			植穴処理土壌混和
カリフラワー	アブラムシ類	※①	育苗期後半	1回	※⑤	散布
ブロッコリー	アブラムシ類、アザミウマ類	1g/株	定植時	1回	※②	植穴処理土壌混和
	ネギアザミウマ	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3～4ℓ)当り50g	定植当日			散布
ねぎ	クロバネキノコバエ類	6kg/10a	は種時	1回	※②	作条処理土壌混和
	ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ	6kg/10a	定植時			植溝処理土壌混和
わけぎ、あさつき	ネギハモグリバエ	5g/培土ℓ	収穫前日まで	3回以内	1回	株元処理
	アブラムシ類、コナジラミ類、マメハモグリバエ	6kg/10a	は種時			育苗培土混和
しゅんぎく	アブラムシ類、コナジラミ類、マメハモグリバエ	9kg/10a	定植時	1回	※④	植溝処理土壌混和
	アブラムシ類、コナジラミ類、マメハモグリバエ	9kg/10a	収穫3日前まで			生育期株元処理
レタス	ナモグリバエ	10g/培土ℓ	は種時	1回	※②	育苗培土混和
	アブラムシ類	0.5～1g/株	育苗期後半			株元処理
すいぜんじな	アブラムシ類、アザミウマ類	※①	定植時	1回	※④	散布
	ハモグリバエ類	9kg/10a	育苗期後半			植溝処理土壌混和
ばれいしょ	アブラムシ類	9kg/10a	定植時	1回	※④	生育期株元処理
	アブラムシ類	9kg/10a	収穫3日前まで			植溝処理土壌混和
食用ぎく	アブラムシ類、ミカンキイロアザミウマ、マメハモグリバエ	3kg/10a	定植時	1回	※⑦	植溝処理土壌混和
	アブラムシ類、ミカンキイロアザミウマ、マメハモグリバエ	3kg/10a	収穫前日まで			生育期株元散布
きく	ミカンキイロアザミウマ、マメハモグリバエ	2g/株	定植時	1回	※②	植溝処理土壌混和
	アブラムシ類	2g/株	育苗期後半			生育期株元処理
きんせんか	アブラムシ類	1～2g/株	定植時	1回	※④	植溝処理土壌混和
	アブラムシ類	1～2g/株	育苗期後半			生育期株元散布
花き類・観葉植物 (きく、きんせんかを除く)	アブラムシ類	3～5g/培土ℓ	定植前	1回	1回	培土混和
	アブラムシ類	1～2g/株	発生初期			生育期株元散布

※①:セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り50g

※②:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内)

※③:4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、株元散布及び散布は合計3回以内)

※④:2回以内(定植時の土壌混和は1回以内、株元処理は1回以内)

※⑤:5回以内(育苗期は1回以内、定植時は1回以内、定植後は3回以内)

※⑥:4回以内(株元散布は2回以内、散布は2回以内)

※⑦:5回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内)

■使用上の注意事項

- 蜜に対して影響があるので、周辺の蜜にはかからないようにしてください。
- マルハナバチを利用する場合、本剤使用後20日目ごろより後に導入してください。ただし、影響日数は環境条件により多少変動する場合があるので注意してください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 散布の際は必ず農業用マスクなどを着用し、作業後はうがいをしてください。
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

2206SC/ZS10

