

殺虫剤

マイキラー[®]

メタルデヒド水和剤(フロアブル)



「ふき」に適用拡大しました!



マイキラー製品情報



サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学(株)の登録商標



速効的に効く!



マイキラ®

特長

- ナメクジ類、カタツムリ類に高い防除効果があります!
- 接触により速効的に作用します!

農林水産省登録 第16688号
有効成分:メタアルデヒド 30.0%
性状:白色水和性粘稠懸濁液体
毒性:劇物
有効年限:3年
包装:500ml×20
殺虫剤分類 —

【効果の認められているナメクジ類・カタツムリ類】

みかん栽培で



梅雨時期の被害防止に!

ナメクジ類

- アシヒダナメクジ
- コウラナメクジ
- フタスジナメクジ
- チャコウラナメクジ
- ノハラナメクジ

カタツムリ類

- ウスカワマイマイ
- アフリカマイマイ
- オカモノアラガイ
- オオクビキレガイ

キャベツ

レタス栽培で



葉間への侵入、徘徊痕や被害の防止に!

適用病害虫名および使用方法

2023年10月18日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り 使用流量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	—	ナメクジ類 カタツムリ類	200倍	200～700ℓ	収穫30日前まで	3回以内	散布	6回以内 (散布及び株元散布は 合計3回以内)
キャベツ			100～300ℓ	収穫14日前まで	6回以内 (散布及び株元散布は 合計3回以内 (但し、株元散布は 2回以内))			
レタス								
非結球レタス		200～500倍	500倍	収穫7日前まで	2回以内	6回以内 (散布は3回以内)		
ふき		ナメクジ類				6回以内 (散布は2回以内)		

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り 使用流量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む 農薬の総使用回数
花き類 観葉植物	花き類・観葉 植物栽培温室 等の生息地	ナメクジ類 カタツムリ類	100~200倍	100~300ℓ	—	6回以内	散布	6回以内
ナメクジ類、 カタツムリ類が 加害する 農作物等	ほ場周辺 雑草地の 生息地						作物にかか らないよう に土壌表面 散布する	

⚠ 使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- ほ場周辺雑草地の生息地を対象として使用する場合、ほ場周辺の雑草地に散布し、作物に直接散布しないよう又、ドリフトに注意して使用してください。
- 医薬用外劇物。取り扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とし、うがいをするとともに洗眼をしてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼をしてください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な鍵のかかる場所に密栓して保管してください。

上手な使い方

- 使用前に容器を反転させ、よく振ってからご使用ください。
- 降雨後など、湿度の高いときに散布することをおすすめします。
- カタツムリ類を対象に散布する場合は、カタツムリ類が活動しているのを確認してから散布してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-MK2023.10K

取扱い



JAグループ

農

協



経済連



サンケイ化学株式会社

本社

〒891-0122 鹿児島市南栄 2 丁目 9

☎(099) 268-7588

九州北部営業所

〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町 1154-3

☎(050) 3508-7912

宮崎事務所

〒880-0056 宮崎市神宮東 3-6-19

☎(0985) 25-7051