

展着剤

プラテン80



作物への
付着性向上に！

薬液の付着しにくい作物にも
効果を発揮！

主剤の効果を十分に引き出し
効果を安定させます！！



おすすめの使用量

- 稲・キャベツ・ねぎ・さといも等、
薬液が付着しにくい作物には **10ℓあたり2～3ml**
- 果樹、野菜等で
薬液が付着しやすい作物には **10ℓあたり1～2ml**



サンケイ化学株式会社

展着剤

プラテン80

登録番号：農林水産省登録 第14262号
性状：白色透明液体
毒性：普通物
(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)
有効年限：5年
包装：500ml×20

有効成分：ポリオキシエチレンドデシルエーテル 80.0%
(ポリ(オキシエチレン) = アルキルエーテル (PRTR・1種) 43.2%)

特 長

薬液のつきにくい作物に対しても、薬液が速やかに植物表面に拡がり、主剤の効果を安定させます。

適用および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当り使用量 (希釈倍数)	使用方法
MEP剤	ぶどう (休眠期)	10～15ml (667～1,000倍)	添加
TPN剤	茶 (摘採直後)	12.5ml (800倍)	
殺菌剤・殺虫剤	稲、キャベツ、ねぎ類、さといも等の 薬液のつきにくい作物	2～3ml (3,333～5,000倍)	
	果樹、野菜等の薬液のつきやすい作物	1～2ml (5,000～10,000倍)	

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤を添加する適用農薬の使用方法、使用上の注意事項を厳守してください。
- 本剤は、ぶどうのブドウトラカミキリの冬期防除に際し、MEP剤に添加して使用してください。
- 生育期散布において薬害を生じやすい薬剤に本剤を添加すると、薬害を助長する恐れがあるので使用をさけてください。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。



● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



JAグループ

農 協

全 農

経済連

全 農 は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本 社 鹿児島市南栄2丁目9 ☎ 099-268-7588
九州北部営業所 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎ 0942-81-3808
宮 崎 営 業 所 宮崎市神宮東3丁目6-19 ☎ 0985-25-7051

2301SA/BU2