


細菌性病害の総合防除に!!

マスタピース® 水和剤

生物殺菌剤



トマト



はくさい



レタス



ブロッコリー



キャベツ



だいこん



マンゴー



ミニトマト



ねぎ



ばれいしょ



うめ



桃



かんきつ

生きた微生物が
植物を効果的に保護

ばれいしょの軟腐病をはじめ、野菜類の軟腐病、アブラナ科野菜の黒斑細菌病、花蕾腐敗病、レタスの腐敗病、斑点細菌病、もものせん孔細菌病といった多種類の細菌病を効果的に予防できます。



マスターピース® 水和剤

有効成分：シュードモナス ロデシア HAI-0804 株 5×10⁹CFU/g
剤 型：水和剤
包 装：100g×30 袋
有効年数：冷蔵（4℃以下）4年、常温（25℃）1年

特 長

1.使用方法

●細菌病はカビの病気に比べて増殖力が高いため、感染タイミングに合わせて予防的に散布してください。

2.使用しやすい

●降雨による影響が少ないです。
●作物に対する汚れは極めて少ないです。
●多くの殺菌剤や殺虫剤との混用事例があります。
混用できない薬剤においても、1日以上空けての近接散布が可能です。
●使用回数制限がなく、収穫前日まで使用することが出来ます。

3.環境に優しい

●各種薬剤耐性菌に対しても効果的です。
●有用昆虫等への影響がほぼありません。
●減農薬栽培、無農薬栽培等のJAS認証制度に適しています。



混用事例は
こちらから

■ 適用作物および病害

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シュードモナス ロデシアを含む 農薬の 総使用回数
※野菜類 (だいこん、はくさい、ブロッコリー、キャベツ、 レタス、非結球レタス、かぼちゃ、 ズッキーニ、しょうが、トマト、ミニトマト を除く)	軟腐病	1,000~ 2,000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日 まで	-	散 布	-
だいこん、はくさい	軟腐病 黒斑細菌病						
キャベツ	軟腐病 黒斑細菌病 黒腐病						
レタス、非結球レタス	軟腐病 腐敗病 斑点細菌病						
ブロッコリー	軟腐病 黒斑細菌病 花蕾腐敗病						
しょうが	腐敗病						
かぼちゃ、ズッキーニ	軟腐細菌病						
トマト、ミニトマト	茎えそ細菌病 軟腐病 かいよう病	1,000~ 4,000倍	200~700ℓ /10a				
かんきつ	かいよう病						
小粒核果類	せん孔細菌病						
もも、ネクタリン	せん孔細菌病	2,000倍					
マンゴー	枝枯細菌病 かいよう病						
キウイフルーツ	かいよう病						

※通知改正により作物分類が変更となり、ばれいしょ等のいも類が「野菜類」に含まれています。

使用上の注意事項

△効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 本剤の有効成分は生菌であるので、開封後はすべて使いきってください。
- 予防効果が主体なので、発病前から発病初期に7~10日間隔で散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調整してください。
- みずかけな（水掛菜）に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- みずいも、せり、フレソ、くわい、じゅんさい、ひし、まこもたけ、れんこん及びわさびに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

△安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の担当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

保管等に対する注意

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。夏場は冷蔵庫保存（10℃以下）をお勧めします。
※常温で保存する場合は、お手元に渡ってから1年以内にご使用ください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は圃場に放置せず、適切に処理してください。

本資料は2023年11月現在の登録内容に基づいています。

JAグループ
農 協 | 全 農 | 経済連
全 協 | 登録商標 第4702318号

製造元  日本曹達株式会社
本 社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1

販 売  サンケイ化学株式会社
本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄2-9 ☎099(268)7588
東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 ☎03(3845)7951