

しつこいアワも速効クリア

消泡スプレー


あわナックス[®]

あわナックス[®]の消泡効果

湧き上がる泡も 素早く消える！



薬液調製直後



あわナックス噴霧直後

あわナックス[®]の特長

- 数秒で消泡効果を発揮。
- 希釈液調製前にあらかじめ処理しても消泡効果を発揮。
- 2回目の連続調製時にも消泡効果が持続する。
- 使用する薬液への展着性、乳化性等に影響がない。



サンケイ化学株式会社



製品情報はこちら

消泡スプレー[®] あわナックス

有効成分：高重合シリコン

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称）

有効年限：3年

規格：300 mL（トリガー式スプレータイプ）

使用方法

使用目的	使用方法
農薬散布液調製時および散布器具等洗浄時の 消泡または泡立ち防止。	噴霧

- 泡に向けて吹きつけるように複数回噴霧してください。噴霧後、薬液を攪拌すると、より確実に消泡できます。
- 希釈液調製前に噴霧しておく、泡の発生を防止することができます。
- 複数回の薬液調製を行う場合、最初の薬液調製時に本剤を使用すると2回目の薬液調製時の泡の発生を抑えることができます。

使用の目安

泡を消す場合

100 L に対して1～2回
噴霧してください。



泡を発生しにくくする場合


〈薬液調製前に〉
100 L に対して3～8回
噴霧してください。




効果持続性

消泡効果と持続性

250 mL シリンダー試験



300 L タンクにおける連続調製時消泡確認試験



使用上の注意事項

- 使用直前に必ずよく振ってからご使用ください。
- 起泡性を必要とするフォームスプレー（泡散布）用の薬液にはご使用になれません。
- ジベレリンなどの植物成長調整剤の薬液にはご使用になれません。
- ご使用の際はマスク、手袋などをして噴霧した霧を吸入しないように注意し、作業後は頭、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 直射日光をさけ、子供の手の届かない場所に、食品と区別して保管してください。
- 5℃以下の低温な場所へ長期保管した場合、噴霧が不十分になる場合があります。その場合は室温にて保温後、よく振ってご使用いただければ、噴霧が良好になります。
- -5℃以下の場所へ保管すると、凍結するおそれがありますので注意してください。
＊凍結（固化）した場合、室温にして解凍後、よく振ってご使用いただければ、消泡効果へ影響はありません。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

取扱い



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 ☎099-268-7588
 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎048-551-2122
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 ☎06-6305-5871
 九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎050-3508-7912
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 ☎0985-25-7051