

ヤマビル用忌避剤


ヒルムナー

被膜形成成分配合により、
ヤマビルの侵入を
長時間防止!
ディート不使用!

扱いやすい
トリガースプレータイプ!

天然物由来成分の
有機酸(クエン酸)を
有効成分として配合!

ひるむことなく立ち向かえ!



サンケイ化学株式会社

ヤマビル用忌避剤 ヒルムナー


300mL×10

特長

- 天然物由来成分の有機酸（クエン酸）を有効成分として配合
- 扱いやすいトリガースプレータイプ！
- 被膜形成成分配合により、ヤマビルの侵入を長時間防止！

使用方法

- 靴（長靴、足袋等）や衣類へ十分濡れるよう均一に散布してください。
- ※散布時には、直接皮膚や眼にはかからないよう、十分注意してください。
- 薬剤処理面の乾き具合やヤマビルの様子を適宜観察し、必要に応じて追加散布してください。
- ※散布後10～20分程度、薬剤処理面を乾燥させると、より効力が安定します。



長靴へ十分量を散布した直後の様子



薬剤処理面を乾燥させた後の様子

使用上の注意

- 記載以外に使用しないでください。
- 取扱いは換気の良い場所で行い、作業場の換気は十分に行ってください。
- 直接皮膚や眼にはかからないよう、十分注意してください。
- 眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、目の刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、多量の水と石けんで洗い、皮膚刺激が生じた場合は医師の診断／手当てを受けてください。
- 吸入した場合やばく露又はばく露の懸念がある場合は、医師の診断／手当てを受けてください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、気分が悪いときは医師に連絡してください。
- 中身は全て使い切り、直接、河川や下水に流さないでください。
- 高温、火気の近くで取り扱わないでください。
- 色付きの靴や衣類等に適用する際は、予めその一部に少量散布し、影響（変色等）がないことを確認の上、使用してください。

保管上の注意

- 取扱いの都度、容器を密閉してください。
- 小児の手の届かない、なるべく低温で乾燥した場所に、食品と区別して保管してください。

お申込みは

【製造・販売】



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11

☎ (03) 3845-7951

東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1-13-1

☎ (048) 551-2122

大阪営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島2丁目14-6

☎ (06) 6305-5871

本社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄二丁目9番地

☎ (099) 268-7588