

- 切れ味は鋭く!! 高い後食防止効果
- フットワークは軽く!! 1,000倍希釈
- それでいて優しい!! 普通物、魚毒A類

頼れる松枯れ防止用散布剤

モリエート[®]SC

クロチアニジン水和剤

®は住友化学工業(株)の登録商標です。

500ml入

真打ち登場

製造

 住友化学

住友化学工業株式会社
東京都中央区新川2-27-1

販売



サンケイ化学株式会社

本社 鹿児島市南栄2丁目9
東京本社 東京都台東区上野7-6-11

T-0406N-130-T

モリート[®]sc 特長

- ★新しいタイプの新規化合物（ネオニコチノイド系）を有効成分とする殺虫剤です。
- ★低薬量で優れた殺虫効果と後食防止効果を示し、松枯れを防止します。
- ★有効成分は普通物、A類相当で、極めて安全性の高い殺虫剤です。
- ★使用時の希釈倍数が1,000倍ですので単位面積当たりの製剤使用量が少なく、作業の効率化が可能です。

モリート[®]sc 登録内容

2004年5月現在の登録内容

作物名	適用病害虫	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤及びクロチアニジンを含む農薬の総使用回数	使用方法
ま っ (生立木)	マツノマダラ カミキリ成虫	1000倍	3L/本 (樹高10m)	成虫の発生初期 及び 発生最盛期直前	4回以内	散 布

●有効成分：クロチアニジン [(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン]30.0%

●毒 性：普通物

●魚毒性：A類

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前にはよく振って使用する。
- マツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり、成虫の発生直後又は発生初期に時期を失ないように散布し、更に20日後（成虫発生最盛期直前）にもう一度散布すると効果的である。
- 散布液量は、樹高10mのマツ1本当たり3ℓを標準とし、木の大きさにより適宜増減し、樹冠部を中心に全面に散布する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 激しい降雨の予想される場合は使用を避ける。

⚠ 安全使用上の注意

- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 桑園がある地域では使用しない。（蚕毒）
- ミツバチを放飼している地域では使用を避ける。
魚毒性…通常の使用方法では該当がない。
保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

- ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。
- 使用量に合わせ薬量を調製し、使い切る。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し（洗浄水はタンクに入れる）、適切に処理する。