

緑化用展着剤

レインコート[®]

®はサンケイ化学株式の登録商標



レインコートの特長

■ 付着性の向上

まつ枝葉へのMEP剤の付着性を向上します。

■ 優れた耐雨性

降雨によるMEP剤の脱落を抑制します。

■ 高い飛散抑制効果

散布時の薬液の飛散を抑え、作業の安全性を高めます。

■ 高い安全性

成分は人畜毒性、魚毒性共に安全性の高い植物由来物質です。

登録内容

【適用病害虫名および使用方法】

適用農薬名	作物名	使用量（希釈倍数）	使用方法
MEP剤	まつ	33mℓ/散布液10ℓ（300倍）	添加



サンケイ化学株式会社

緑化用展着剤 レインコート®

®はサンケイ化学株式の登録商標

登録番号：農林水産省登録 第21859号
有効成分：デカノイルオクタノイルグリセロール…90.0%
性状：淡黄色澄明可乳化油状液体
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものをいう通称）
有効年限：3年
規格：1ℓ×12

試験成績（耐雨性）

試験場所：鹿児島県林業試験場


供試樹：クロマツ3年生苗

検定薬剤：MEP MC


薬剤処理：2001年4月16日、所定濃度の薬液を小型噴霧器で十分散布（10ml/株）

※散水処理：薬剤散布後の7日間、各株に対して10mmの降雨相当量の水をジョウロで所定回数散水した。

MEP MC処理後のMEP付着量の推移（松枝）




マツノマダラカミキリ成虫に対する殺虫効果比較



試験成績（飛散抑制）

レインコート添加による飛散抑制効果



試験場所：福岡県前原市 ゴルフ場練習グリーン

散布時期：2007年5月21日

検定薬剤：MEP MC

散布機：無人ヘリコプター

飛行高度：15 m

風速：MEP MC + レインコート散布時 …0.8～1.8m/s
MEP MC 単用散布時 …0.7～1.6m/s

使用上の注意事項

- 本剤を添加する適用農薬の使用法、使用上の注意事項を厳守してください。
- 所定量の水に本剤を加えてよくかき混ぜてから、主剤を加え、地上散布、空中散布又は、無人ヘリコプター散布の散布液を調製してください。
- 薬液調製後はなるべく早く使用してください。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、目に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 危険物第四類第四石油類に属するので、火気には十分注意してください。
- 火気や直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手のとどかない場所に密栓して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

取扱い



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南米2丁目9番地 TEL (099) 268-7588
東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 TEL (03) 3845-7951
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 TEL (048) 551-2122
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 TEL (06) 6305-5871
九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 TEL (0942) 81-3808

202212SA/BU