

天然成分(硫黄)で環境への負荷が
少ない忌避剤です

農林水産省登録
第24736号

獣害忌避剤
カジラン[®]S
塗布剤

硫黄塗布剤

クマ剥皮被害防止



シカ食害防止



カモシカ食害防止



簡単な処理

薬液調製が不要で原液を直接塗布
する薬剤です。

高い安全性

人畜及び水生生物に影響がなく
環境影響の小さい普通物の製剤
です。

長い忌避効果

固着性を高めた特殊処方により、
降雨、降雪の影響が少なく、長期に
わたって剥皮被害、食害を防止します。



人に自然にやさしく、獣と自然との共生をめざします。



サンケイ化学株式会社



製品情報・SDSは
こちらから

獣害忌避剤

カジラン®S 塗布剤

登録番号: 第24736号
 有効成分: 硫黄 3.0%
 性状: 淡黄色粘稠懸濁液体
 人畜毒性: 普通物
「毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称」
 有効年限: 5年
 包装: 800g×10

使用目的及び使用方法

2024年5月17日現在の登録内容


作物名	使用目的	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
ひのき すぎ	ニホンジカ、カモシカによる食害防止	1樹当たり1~5g	被害発生前	-	原液塗布	-
	クマによる剥皮被害防止	胸高直径 10cm未満 : 10g 10~20cm未満 : 11~20g 20~30cm未満 : 21~30g 30~40cm未満 : 31~40g 40~50cm未満 : 41~50g 50cm以上は10cm増す毎に10g追加				

薬剤処理方法



林業薬剤協会委託試験

山形県
森林研究
研修センター
カジランS
塗布剤処理
4ヶ月後の
ツキノワグマ
剥皮被害率



使用上の注意事項

- 使用する前にはよく振ってください。
- ニホンジカ、カモシカによる食害防止を目的に使用する場合は樹木の樹高により使用量を増減させ、特に樹木の食害が予測される個所に薄く広げるように満遍なく処理してください。なお、枝葉がよく繁茂している場合は適宜処理量を増加させてください。
- クマによる剥皮被害防止を目的に使用する場合は樹木の胸高直径により使用量を増減させ、特に樹木の被害が予測される地際部の幹回りに点状に処理してください。なお、根曲がり木を対象とする場合は地際部より高い場所に複数処理してください。
- 処理直後の降雨は効果を低下させることがあるので、天候をよく見極めてから処理してください。
- 処理に使用した器具、空容器等は必ず回収し、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は林業関係機関、林業技術者等の指導を受けてください。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管上の注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所に置かないでください。

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11
 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1-13-1
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2-14-6
 本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2-9
 九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3

☎(03) 3845-7951
 ☎(048) 551-2122
 ☎(06) 6305-5871
 ☎(099) 268-7588
 ☎(050) 3508-7912