

殺虫剤


ネキリスター®

クロチアニジン粒剤

®はサンケイ化学㈱の登録商標です。



製品情報はここから



株元にまくだけ！



ネキリムシ類



コオロギ類



まとめて 防除！



ダンゴムシ



アブラムシ類



サンケイ化学株式会社

殺虫剤



農林水産省登録 第24452号

有効成分：クロチアニジン 0.25%

性状：黄赤色細粒

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称）

有効年限：4年

規格：2kg×8

殺虫剤分類 4A

特長

■ 土壌潜伏性・地上徘徊性の害虫に有効

土壌潜伏性のネキリムシ類、地上徘徊性のコオロギ類・ダンゴムシを誘引し、害虫が摂食することで効果を発揮するベイト剤（毒餌）です。

■ 根からの吸収移行でも作用

有効成分が根から吸収移行することにより、作物に寄生するアブラムシ類に対しても効果を示します（発生初期の密度抑制）。

■ 小粒化製剤

小粒のため、害虫との遭遇率が上がり、効果が安定します。

■ 省力的に使用できる

水を使わず株元に散布するだけなので、省力的かつ簡単に処理できます。

■ 着色した製剤

燈色なので散布したところが分かりやすい製剤です。

■ 高い安全性

人畜に対して安全性の高い普通物です。


■ 適用病害虫名および使用方法

2026年8月17日現在の登録内容


作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む 農薬の総使用回数
はくさい レタス	アブラムシ類	3～6kg	収穫30日前まで	2 回以内	株元散布	5 回以内 〔 定植時までの処理は 1 回以内、 定植後の散布は 2 回以内、 定植後の株元散布は 2 回以内 〕
	コオロギ類 ネキリムシ類 ダンゴムシ	3kg				
非結球レタス	アブラムシ類	3～6kg	収穫前日まで			
	コオロギ類 ネキリムシ類 ダンゴムシ	3kg				

■ 試験成績


ネキリムシ類




ダンゴムシ



コオロギ類



アブラムシ類



■ 使用上の注意事項

- 作物にかからないよう株元の土壌表面に散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

■ 安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

■ 保管に関する注意事項

- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく冷凍で子供の手が届かない場所に密封して保管してください。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

取扱い



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 ☎099-268-7588
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎048-551-2122
大阪営業部 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 ☎06-6305-5871
福岡営業部 〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-13 ☎050-3508-7912
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 ☎0985-25-7051