

Glufosinate generic herbicide

非選択性茎葉処理 除草剤

農林水産省登録
第25016号

TAJ タージ

畔は崩さず、草だけ倒す

グルホシネート液剤

農薬登録製品



インドの叡智、降臨

グルホシネートの 新規除草剤



※ボトルはイメージです

確かな効果を、より身近に!
他剤で枯れにくい雑草にも!
安心の農薬登録製品!



タージの効果



スギナ



無処理

タージ処理



オヒシバ



オオアレチノギク



ツクサ

日本植物調節剤研究協会 岡山試験地 (2015年) ※休耕田処理
(対象草種: ヒロハホウキギク、ヤナギタデ、ノビエ、ケキツネノボタン等)



サンケイ化学株式会社

製品情報はこちら



※TAJ (タージ) は、インドのシャルダ・クロップケム (Sharda Cropchem Limited.) の製品です。

非選択性
茎葉処理
除草剤

TAJ タージ

農林水産省登録 第25016号

除草剤分類 10

有効成分：グルホシネート…18.5%

有効年限：4年

性 状：青緑色澄明水溶性液体

規 格：500mL×20、1L×10、

人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

5L×4、20L

特
長

- グルホシネートの新規除草剤。
- 食用作物の農薬登録も取得。
- 効果の発現が比較的速く、殺草スペクトラムが広い。
- 難防除雑草のスギナ、ツユクサ、オヒシバ、オオアレチノギクなどに高い効果。

- 水田畦畔やのり面が崩れにくい。
- 果樹園で使用する場合に、果樹への影響が少ない。
- 人と環境に対する安全性が高い。



すごいわ、
タージ！

適用雑草と使用方法（2026年7月現在）

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及び グルホシネートPを含む 農薬の総使用回数				
				薬量 (mℓ/10a)	希釈水量 (ℓ/10a)							
小麦	—	一年生雑草	は種前(雑草生育期)	300～750	100～150	1回	雑草茎葉散布	4回以内 (は種後は3回以内)				
	圃場内の周縁部		は種後出芽前(雑草生育期)	300～500		3回以内						
収穫7日前まで(雑草生育期)			3回以内									
かんきつ、りんご	—	多年生雑草		収穫21日前まで(雑草生育期)		500～1000		2回以内	3回以内			
ぶどう、なし、かき、もも		一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期)	300～500		2回以内						
キャベツ、はくさい	—	一年生雑草	雑草生育期定植前又は畦間処理	300～500				100～200	2回以内	3回以内 (萌芽前は1回以内、 萌芽後は2回以内)		
きゅうり、なす、ピーマン、トマト、ミニトマト						収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)			3回以内			
ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー						収穫45日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)			2回以内			
だいこん						収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理)						
ほうれんそう						収穫30日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)						
レタス						収穫14日前まで(雑草生育期挿苗前又は畦間処理)						
かんしょ						雑草生育期植付前又は植付後萌芽直前			1回			
ばれいしょ						収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期)			2回以内			
えだまめ						—			は種前(雑草生育期)		300～500	3回以内
					は種後出芽前(雑草生育期)							
					定植5日前まで(雑草生育期)							
					収穫14日前まで(畦間処理:雑草生育期)							
さやいんげん、さやえんどう					—	は種前(雑草生育期)	300～500		3回以内			
						定植前(雑草生育期)						
						収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)						
水稻(水田畦畔)					水田畦畔	一年生雑草、多年生広葉雑草	収穫7日前まで(雑草生育期)		500～1000		2回以内	3回以内
水田作物、畑作物(休耕田)					休耕田	一年生及び多年生雑草	雑草生育期		3回以内		3回以内	
水田作物(水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	300～500	1回	1回						
花き類・観葉植物	—		雑草生育期 畦間処理		3回以内							
樹木類												
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等	多年生雑草	雑草生育期	500～1000	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内					
			1000～2000									

【試験成績】 水田畦畔処理 / 日本植物調節剤研究協会研究所千葉支所・2015年

タージ薬量 (希釈水量)	抑草期間	薬害	実用性※
500mL (100L)	30日以上	無	○
500mL (150L)	30日以上	無	○
1000mL (100L)	30日以上	無	◎

※いずれの処理区も対照剤Aと同等程度の効果で実用性あり
(対象草種：メヒシバ、ツユクサ、スギナ、イヌビエ、アメリカセンダングサ、ウマゴヤシ)

かんきつ圃場下草処理 / 天草農業研究所・2016年夏期 ※無処理区の残草率：100%

タージ薬量 (希釈水量)	効果完成	残草率 (殺草力)	抑草期間	薬害	総合評価※
300mL (100L)	9日	0% (強)	38日 (長)	無	+++
300mL (150L)	10日	0% (強)	39日 (長)	無	+++
500mL (100L)	9日	0% (強)	44日 (長)	無	+++
対照剤A・300mL (100L)	9日	0% (強)	41日 (長)	無	+++

※+++：実用性あり (非常に優れた)
(対象草種：オヒシバ、メヒシバ、ホナガイヌビユ、エノキグサ、マルバツユクサ)

使用上の注意事項

- 泥などで濁った水は効果を低下させるので本剤の調製には用いないでください。
- 使用量に合わせ薬液を調整して使いきってください。
- 展着剤の加用は必要ありません。
- 本剤は通常2~5日で効果が発現し、効果完成まで1~2週間ほど要するので、誤って再散布や刈払い、耕起をしないでください。
- 本剤は土壌に落下すると速やかに不活性化して、効果が発現しないため、薬液が雑草の茎葉全体に均一にかかるように散布してください。また、本剤は雑草生育期 (草丈30cm以下) に有効なので、時期を失ないように散布してください。
- 散布後6時間以内の降雨は効果が低下することがあるため、天候に注意して散布してください。
- 農作物や有用植物に薬液が付着すると薬害を生じるため、かからないように十分注意してください。特に野菜類や花き類の生育期畦間散布で使用する場合には、作物にかからないように十分注意して散布してください。
- 水源池などに本剤が飛散、流入しないように十分に注意してください。
- 散布器具、容器などの洗浄水は河川などに流さず、空容器などは放置せず、環境に影響を与えないように適切に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後 (少なくとも散布当日) に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物 (魚類) に影響を及ぼすおそれがあるので、養魚田周辺での使用には注意してください。

保管上の注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

NIK-TAJ-2026-07

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

取扱い

販売



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南榮2丁目9
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1
大阪営業部 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6
福岡営業部 〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-13
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3丁目6-19
☎(099)268-7588
☎(048)551-2122
☎(06)6305-5871
☎(050)3508-7912
☎(0985)25-7051