


ガードベイト® A

ペルメトリン粒剤

特長

- ◎ネキリムシを誘引し、摂食させることで効果を発揮するベイト剤です。
- ◎成分は合成ピレスロイドなので、優れた殺虫・被害防止効果があります。
- ◎赤色の粒剤ですので、散布したところがよくわかります。



とうきに
適用拡大



ネキリムシ

ネキリムシから
大切な作物を守る!!



ガードベイトAの形状



製品情報・SDSは
こちら



サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学(株)の登録商標

ガードバイト® A

農林水産省登録 第20919号
有効成分:ベルメトリン 0.1% 包装: 2kg×8
性状:淡赤色粒状
毒性:普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指す)という通称)
殺虫剤分類 3A

適用病害虫名および使用方法

2026年6月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量 (10a 当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む 農薬の総使用回数	
はくさい	ネキリムシ類	3kg	は種時～生育初期	5 回以内	株元散布	5 回以内	
ごぼう			は種後～発芽前		土壌表面散布		
だいこん			は種時～生育初期	4 回以内	株元散布	4 回以内	
オクラ				3 回以内		3 回以内	
キャベツ			生育初期	5 回以内		5 回以内 (株元灌注は 2 回以内)	
レタス、ブロッコリー カリフラワー						5 回以内	
なす、トマト				3 回以内		3 回以内	
ミニトマト				1 回		4 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布及び噴射は合計 3 回以内)	
ピーマン、いちご			定植前	5 回以内	土壌表面散布	5 回以内	
たまねぎ					株元散布		
かんしょ			生育初期		土壌表面散布		
やまのいも			植付前				
さといも			生育初期	4 回以内	株元散布	4 回以内	
とうもろこし、ばれいしょ				3 回以内		3 回以内	
なばな類、ねぎ、わけぎ あさつき、豆類 (未成熟) そらまめ、だいず、きゅうり				5 回以内		5 回以内	
かぼちゃ				2 回以内		2 回以内	
ほうれんそう、しゅんぎく			生育初期 但し 収穫 14 日前まで	2 回以内		5 回以内 (乳剤は 3 回以内、 粒剤は 2 回以内)	
たかな						4 回以内 (乳剤は 2 回以内、 粒剤は 2 回以内)	
非結球レタス			生育初期 但し 収穫開始 7 日前まで	3 回以内		6 回以内 (乳剤は 3 回以内、 粒剤は 3 回以内)	
ズッキーニ			生育初期 但し 収穫 7 日前まで	5 回以内		5 回以内	
にんじん				3 回以内		3 回以内	
もりあざみ			生育初期 但し 収穫 14 日前まで	2 回以内		2 回以内	
エンサイ				4 回以内		4 回以内	
飼料用とうもろこし (青刈り)							
ヤングコーン			生育初期 但し 収穫 30 日前まで	2 回以内		2 回以内	
葉しょうが			定植時～発芽期 但し収穫 120 日前まで				
しょうが			定植時 但し 収穫 21 日前まで	2 回以内		4 回以内 (乳剤は 2 回以内、 粒剤は 2 回以内)	
エンダイブ			生育初期 但し 収穫 90 日前まで				
にんにく			収穫 3 日前まで	4 回以内		4 回以内 (散布は 2 回以内)	
かぶ				3 回以内		3 回以内	
にら、にら (花茎)			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内	
アスパラガス、パセリ						4 回以内 (乳剤は 2 回以内、 粒剤は 2 回以内)	
はっか			収穫 7 日前まで	3 回以内		2 回以内	
しそ						3 回以内	
とうがらし類			収穫 30 日前まで	4 回以内		4 回以内	
食用おおばこ (種子) らっかせい			収穫 90 日前まで				
いんちんこう			生育初期	6 回以内		6 回以内	
びゃくし							
とうき			定植時	1 回		1 回	
花き類・観葉植物			定植時	1 回		1 回	
たばこ							

△ 使用上の注意事項

- 作物体上から作物の地際表面に散布してください。
- みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 蚕に長期毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。


△ 安全使用上の注意事項

- 誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際は、マスク、手袋などをしてください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

△ 貯蔵上の注意事項

- 直射日光をさけ、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

〈上手な使い方〉



混和せずに、株元散布もしくは土壌表面散布でお使いください。
使用にあたっては上記適用表を確認の上
お使いください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-GBA-2026.06

取扱い



サンケイ化学株式会社

本
東 京 営 業 部
大 阪 営 業 所
福 岡 営 業 所
宮 崎 事 務 所

鹿児島市南栄2丁目9
埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1
大阪市淀川区西中島2丁目14-6
福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-13
宮崎市神宮東3-6-19

☎(099) 268-7588
☎(048) 551-2122
☎(06) 6305-5871
☎(050) 3508-7912
☎(0985) 25-7051