除草剤
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル粒剤

サラブレッドKAI®１キロ粒剤

農林水産省登録　第２３１１９号
（協友アグリ（株）登録）
性状：類白色細粒
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
危険物： 非該当
有効年限：５年
包装：１kg×１２，４kg×４，
（（１０x２）X２）（受注生産の担い手直送規格）

有効成分：イマゾスルフロン・・・・・・・・・・・・・・・・0.９０％
オキサジクロメホン・・・・・・・・・・・・・・・0.４０％
ピラクロニル・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.0％

除草剤分類　２，３０，１４

サラブレッドKAI®は協友アグリ（株）の登録商標です。

特長

○ノビエに安定した効果（２.５葉期まで）と長期残効性を持つ一発処理除草剤です。
○SU抵抗性雑草および多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示します。
○効果の発現が非常に速い特性があります。
○温度による効果変動が少ない薬剤です。
○水稲への安全性が高く、田植同時処理にも対応します。

適用雑草名及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	１０アール当り使用量	使用方法	本剤の使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数
移植水稲	一年生雑草 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	１kg	１回	田植同時散布機で施用	２回以内	２回以内	２回以内
		移植直後～ノビエ２.５葉期ただし、移植後３０日まで			湛水散布又は無人航空機による散布			
直播水稲	一年生雑草 ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ セリ	稲１葉期～ノビエ２.５葉期 ただし、収穫９０日前まで	１kg	１回	湛水散布又は無人航空機による散布	２回以内	２回以内	２回以内

使用上の注意事項

●使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
●本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの２.５葉期までに時期を失しないように散布してください。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワは２葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈３cmまで、アオミドロ･藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
●散布に当っては、水の出入りを止め湛水状態（水深３～５cm）で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも３～４日間は通常の湛水状態を保ち、散布後７日間は落水、かけ流しはしないでください。
●浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
●著しい降雨が予想される場合には、除草効果が低下するおそれがあるので使用を控えてください。
●空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

薬害
●軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田（減水深２cm／日以上）では、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
●直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
●本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
●いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
●本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。

安全使用上の注意事項

●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物に係る注意事項

●水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
●散布後は水管理に注意してください。
●散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。

保管に関する注意事項

●密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。