殺虫剤
メタルデヒド水和剤

マイキラー[®]

農林水産省登録 第24101号

性状：白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものをいう通称）

危険物：非該当

有効年限：4年

包装：500ml × 20

有効成分：メタルデヒド・・・10.0%

殺虫剤分類

—

マイキラー[®]はサンケイ化学（株）の登録商標です。

特長

- ナメクジ類・カタツムリ類に高い防除効果があり、接触により速効的に効果を示します。
- 人畜に対して安全性の高い普通物です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタルデヒドを 含む農薬の 総使用回数
かんきつ	ナメクジ類	200倍	200～ 700ℓ	収穫30日前 まで	3回以内	散布	6回以内 (散布及び株元散布は 合計3回以内)
	カタツムリ類						
キャベツ レタス	ナメクジ類	400倍	100～ 300ℓ	収穫14日前 まで	3回以内	散布	6回以内 (散布及び株元散布は 合計3回以内 (但し、株元散布は 2回以内))
	カタツムリ類						
非結球レタス	ナメクジ類	400倍	100～ 300ℓ	収穫14日前 まで	3回以内	散布	6回以内 (散布は3回以内)
	カタツムリ類						
花き類・観葉植物	ナメクジ類	400倍	100～ 300ℓ	—	3回以内	散布	6回以内
	カタツムリ類						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	本剤の 使用回数	使用方法	メタルデヒドを 含む農薬の 総使用回数
ナメクジ類、 カタツムリ類が 加害する農作物等	ほ場周辺 雑草地の生息地	ナメクジ類	200～ 400倍	100～ 300ℓ	6回以内	作物にかから ないように土 壌表面散布す る。	6回以内
		カタツムリ類					

使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他の物とは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

保管に関する注意事項

- 直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。