

ナメクジ・カタツムリ駆除剤

メタルデヒド水和剤（フロアブル）

マイキラー[®]L

農林水産省登録 第 24101 号

性状：白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

有効年限：3年

包装：500ml×20

有効成分：メタルデヒド・・・・・・・・・・10.0%

マイキラー[®]Lはサンケイ化学㈱の登録商標です。

特長

- ナメクジ類・カタツムリ類に高い防除効果があり、接触により速効的に効果を示します。
- ナメクジ類・カタツムリ類は種類に関係なく有効です。
- 普通物の製剤です。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	メタルデヒド を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	ナメクジ類 カタツムリ類	200倍	200～ 700ℓ	収穫30日 前まで	3回以内	散布	6回以内 (散布及び 株元散布は 合計3回以内)
キャベツ レタス		400倍	100～ 300ℓ	収穫14日 前まで			6回以内 (散布及び株元散布は 合計3回以内 (但し、株元散布は 2回以内))
非結球レタス				6回以内 (散布は3回以内)			
花き類 観葉植物		6回以内					

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	本剤の 使用回数	使用 方法	メタルデヒド を含む農薬の 総使用回数
ナメクジ類、 カタツムリ類が 加害する農作物等	ほ場周辺雑草地の 生息地	ナメクジ類 カタツムリ類	200～ 400倍	100～ 300ℓ	6回以内	作物にかからない ように土壌表面 散布する	6回以内

使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他の物とは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

上手な使い方

- 使用前に容器を反転させ、よく振ってからご使用下さい。
- ナメクジ・カタツムリは夕方から朝にかけて活動しますので、活動を開始する夕方の散布をおすすめします。
- 降雨後など、湿度の高いときに散布することをおすすめします。
- カタツムリ類を対象に散布する場合は、カタツムリ類が活動しているのを確認してから散布してください。
- ほ場周辺雑草地の生息地に使用する場合、ナメクジ類、カタツムリ類は雑草の間、石の下や敷きわらの下など暗く湿度の高い場所を好んで生息しますので、それらの場所に散布すると効果的です。その際、作物にかからないよう十分に注意してください。



みかん栽培で

梅雨・秋雨時期の被害防止に！

キャベツ・レタス栽培で

結球部への侵入、徘徊痕や被害の防止に！

