

# 殺虫剤

ペルメトリン水和剤

# アディオン®フロアブル

農林水産省登録 第17852号

(住友化学㈱登録)

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

有効年限：5年

包装：500ml×20

有効成分：ペルメトリン(PRTR・1種)・・・10.0%

殺虫剤分類 **3A**

アディオン®は住友化学㈱の登録商標です。

## 特長

- 広い殺虫スペクトラム  
同時発生の数種害虫を併殺できます。
- 優れた殺虫力と速効性  
接触作用により強い殺虫力を示し、薬液が害虫にかかると速効的にノックダウン効果を発揮します。
- 優れた残効性  
優れた残効性により作物を害虫から守ります。

## 適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリンを 含む農薬の 総使用回数
大粒種ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1000～ 2000倍	200～ 700ℓ	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
	コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ	1500倍					
おうとう	オウトウハマダラミバエ ショウジョウバエ	2000倍		収穫前日 まで	2回以内		2回以内
もも	モモハモグリガ	1500～ 2000倍			6回以内		2回以内
	シンクイムシ類 アブラムシ類	1500倍					
ずもも	アブラムシ類 シンクイムシ類	1500倍		収穫14日前 まで	2回以内		2回以内
	キンモンホソガ	1500～ 2000倍					
りんご	ケムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ シンクイムシ類	1500倍		収穫前日 まで	2回以内		4回以内 (散布は2回以 内、噴射は2 回以内)
	シンクイムシ類 カメムシ類	1500～ 2000倍					
くるみ	アメリカシロヒトリ シロテンクロマイコガ	1500倍		収穫7日前 まで	2回以内		2回以内
マルメロ	シンクイムシ類		収穫14日前 まで				
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ	2000倍	収穫前日 まで	5回以内	5回以内		
かき	アザミウマ類 カメムシ類	1000～ 1500倍	収穫7日前 まで				
アスパラガス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500倍	100～ 500ℓ	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	
きく ばら カーネーション	アブラムシ類	1500倍	100～ 300ℓ	—	6回以内	6回以内	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリンを 含む農薬の 総使用回数
宿根かすみそ	アブラムシ類 ヨトウムシ	1500倍	100～ 300ℓ	—	6回以内	散布	6回以内
スターチス	ヨトウムシ						
りんどう	リンドウホソハマキ ヒラズハナアザミウマ						
トルコギキョウ	ヒラズハナアザミウマ						
つつじ類	ツツジアザミ		200～ 700ℓ				

## 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

## 安全使用上の注意事項

- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。(弱い刺激性)
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

## 保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。