

摂食阻害・忌避剤

農林水産省登録 第24242号

# カジラン<sup>®</sup>Sフロアブル

性状：淡黄色水和性粘稠懸濁液体  
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）  
危険物：非該当  
有効年限：3年  
包装：1ℓ×10本紙箱入り

有効成分：硫黄・・・30.0%

カジラン<sup>®</sup>はサンケイ化学（株）の登録商標です。

## 特長

- 簡単な処理  
薬剤調製時に粉立ちせず簡単に調合できるフロアブルタイプです。
- 高い安全性  
天然に存在する硫黄を有効成分とし、作業者並びに環境に対する負荷を抑えた普通物の製剤で、水生生物等にも影響が少なく、安全性が高い製品です。
- 長い忌避効果  
薬液は散布後、1～2時間程度で乾き、固着性を高めた特殊処方により、その後の降雪、降雨の影響が少なく、長期にわたる忌避効果により、食害を軽減します。

## 使用目的及び使用方法

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
樹木類	カモシカ、ニホンジカによる食害防止	10倍	10～50ml/樹	食害発生前	—	散布	—

## 使用上の注意事項

- 使用する前には容器を良く振ってください。
- 使用する前に所定量を所定量の水に希釈し、良くかきまぜてから散布してください。
- 散布液量は樹木の樹高によって増減させ、特に樹木の食害が予測される箇所等重点的に散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 夏季の高温時における散布は、薬害発生のおそれがあるためさけてください。
- 散布直後の降雨または強風時の散布は効果が劣ることがあるので、天候を良く見極めてから散布してください。
- 散布に使用した器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は必ず回収し、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は林業関係機関、林業技術者等の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、林業関係機関、林業技術者等の指導を受けることをおすすめします。

## 安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

## 保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく涼涼で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。