

殺そ剤
クマリン系粒剤

クマリン

農林水産省登録 第 1 2 3 1 4 号
性状：淡赤褐色粒状
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限：3 年
包装：5 0 0 g × 3 0

有効成分：ワルファリン・・・0.1 %

特長
○ネズミの好む穀物等をバランス良く配合し粒剤化していますので、ネズミの食いつきが一段とよくなっています。
○包装の小袋は、特殊加工紙を使用していますので、雨や露の影響をうけにくく、長い間効果を発揮します。

使用目的及び使用方法

作物名	適用場所	適用害獣名	1 0 アール 当り 使用量	本剤の 使用 回数	使用方法	クマリン系を 含む農薬の 総使用回数
野そが加害する 農作物等	農地、山林	野そ	3 0 0 ～ 6 0 0 g	－	本剤 2 0 g を入れた防湿性小袋をそのままねずみの通路に配置する。又は給餌器に入れ、ねずみの出没する場所に配置する。なくなったら補充して、4 ～ 5 日間連続投与する。	－

使用上の注意事項

- 家畜、家禽等が誤食しないように注意してください。
- 野そが人間の体臭をきらう場合があるので作業中は手袋などをして、直接毒餌が手（皮ふ）にふれないようにしてください。
- 犬、ネコ、牛、馬、ニワトリなど家畜・家禽類に毒餌を食われるおそれのある場所での使用はさけてください。特に家禽は本剤に弱いので十分注意してください。
- 効果をあげるため毒餌施用後、喫食箇所に対し、4 ～ 5 日間必ず補充し連続配置してください。
- 誤食などないように小児の手の届かない所に置き、余った毒餌などは回収してください。
- 作業後は顔、手足など皮ふの露出部を石けんでよく洗ってください。
- 配置箇所については堆積物、障害物、樹木の根際その他の出没しやすい場所に配置すると有効です。

安全使用上の注意事項

- ラベルをよく読んで、記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。