

殺虫剤 ジノテフラン粉剤	農林水産省登録 第20814号 (三井化学クロップ & ライフソリューション (株) 登録) 性状：類白色粉末 45 μm以下 浮遊性指数 20以下 毒性：普通物 (毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称) 危険物：非該当 有効年限：5年 包装：3kg×8
-----------------	---

有効成分：ジノテフラン・・・0.50%

殺虫剤分類	4A
-------	----

スタークル®は三井化学クロップ & ライフソリューション (株) の登録商標です。

特長

- 水稻・だいず・えだまめの重要害虫に効果を発揮します。
カメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ・イナゴ類・ニカメイチュウ・フタオビコヤガ・フタスジヒメハムシの防除に使える薬剤です。
- 特にカメムシ類に対しては、種を問わず高い殺虫活性を有し、複数のカメムシ種が混発する地域でも安定した高い防除効果を示します。
また、殺虫効果に加えて優れた吸汁阻害効果を有するため、より効率的にカメムシ被害から収穫物を守ります。
- 稲・だいず・えだまめに収穫7日前まで使えます。また、休耕田の害虫防除にも使えます。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	3kg	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
だいず	—	カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	3kg	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
えだまめ	—	カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	3kg	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
水田作物、畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	3kg	—	3回以内	散布	3回以内

使用上の注意事項

- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - 養蜂が行われている地区や受粉等を目的としてミツバチ等を放飼している地区で使用する場合は、関係機関（都道府県の畜産部局や病害虫防除所等）への連絡を徹底し、ミツバチ等の危害防止に努めてください。

安全使用上の注意事項

- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。

保管に関する注意事項

- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。