

除草剤  
塩素酸塩水溶剤

デゾレート<sup>®</sup>A

農林水産省登録 第9024号  
(株)カーリット登録)

性状：類白色水溶性粗粉106μm以下

毒性：劇物

危険物：第一類塩素酸塩類含有物 第二種酸化性固体

有効年限：5年

包装：1kg×20, 5kg×4

有効成分：塩素酸ナトリウム・・・60.0%

除草剤分類

—

デゾレート<sup>®</sup>は(株)カーリットの登録商標です。

特長

○一年生雑草や多年生広葉雑草に対して安定した高い効果を示します。

適用雑草名及び使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール 当り 使用薬量	10アール 当り 希釈水量	本剤の 使用回数	使用方法	塩素酸塩を 含む農薬の 総使用回数
まつ からまつ とどまつ えぞまつ すぎ ひのき	地ごしらえ	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草生育期	7.5～ 12.5kg	200～ 300ℓ	—	雑草茎葉散布	—
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15kg				
すぎ ひのき	下刈り	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草生育期	7.5～ 12.5kg	200～ 300ℓ	—	雑草茎葉散布	—
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15kg				
開墾後に栽培す る農作物等	開墾地	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草生育期	7.5～ 12.5kg	200～ 300ℓ	—	雑草茎葉散布	—
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15kg				
果樹類	果樹園	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草生育期	7.5～ 12.5kg	200～ 300ℓ	—	雑草茎葉散布	—
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15kg				
桑	桑園	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草生育期 (晩秋期)	7.5～ 12.5kg	200～ 300ℓ	—	雑草茎葉散布	—
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15kg				
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期	7.5～ 15kg	100～ 200ℓ	—	雑草茎葉散布	—
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面等	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期	10～ 25kg	200～ 300ℓ	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布	3回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール 当り 使用薬量	10アール 当り 希釈水量	本剤の 使用回数	使用方法	塩素酸塩を 含む農薬の 総使用回数
移植水稲 直播水稲	刈取跡	マツバイ	刈取後 10日以内	10～ 13kg	80～ 100ℓ	—	雑草茎葉散布	—
		ミズガヤツリ	刈取後～ミズ ガヤツリの塊 茎形成前まで	13kg				

#### 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤の所定量の所要量の水に加え、金属かプラスチックの棒で良く攪拌して溶解してください。
- 本剤使用の際は、展着剤を加用すると効果的です。
- 使用器具、雑草の成長度等の条件により、使用薬量及び希釈水量は所定の範囲内で増減し使用してください。
- 本剤は雑草の種子には効果がないのでなるべく結実前に散布し、再生したら再散布してください。
- 本剤の散布直後に石灰又は木灰を施用すると本剤の効果が低下することがあるので注意してください。
- 降雨時の散布または降雨の予想される時の散布は、効果を減ずるので散布を見合わせてください。
- チガヤには効果が劣るので、再生した場合再散布してください。
- 本剤を水稲刈取り跡のマツバイおよびミズガヤツリ防除に使用する場合は次の事項に注意してください。
  - 本剤は生育期間中のマツバイおよびミズガヤツリに有効なので、マツバイおよびミズガヤツリの枯葉出現前に処理してください。
  - ミズガヤツリを水稲とともに刈取るところでは、ミズガヤツリの再生後なるべく早く散布してください。
  - ミズガヤツリ防除に使用する場合、ミズガヤツリの塊茎形成後では効果が劣るので刈取り後が塊茎形成前になる地帯でだけ使用してください。従って処理後地下茎から発生する地帯では使用をさけてください。
  - 本剤は排水良好な一毛作田で使用し、散布前に落水し、マツバイおよびミズガヤツリを露出させてから茎葉に均一に散布してください。
  - 本剤の連年使用はなるべくさけてください。
- 本剤を地ごしらえ、果樹園、桑園、開こん地などの除草に使用する場合は次の事項に注意してください。
  - 散布前には雑草木の葉を刈りこまないでください。
  - 果樹園及び下刈りの場合は、果樹及び林木の葉や小枝や根元に薬液がかからない様に風向きなどに十分注意してください。
  - 桑は、果樹に比べて本剤に弱いので夏季の散布をさけ養蚕の終わった晩秋に散布してください。
  - 下刈りに使用する場合、植付当年の使用はしないでください。
- 畦畔雑草防除を目的として使用する場合、のり面の散布は避けてください。又流入、飛散等による薬害に注意してください。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しないでください。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤散布地を農耕地に利用する場合は、散布後3ヵ月以上経過してから播種または植付けしてください。
- 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分注意してください。
- 本剤は難燃性になっており火災の危険は少ないが、使用器具は木製など可燃性のはしき、使用後は水洗いをしてよく乾かしてください。
- 散布器具の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

#### 安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取り扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は、防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗いうがいをするとともに洗眼してください。
- 薬剤がしみ込んで乾いた衣服や地下足袋などは着火して火傷をおこし易いので、火気には注意してください。着火の際は水をかけて消してください。作業終了後、薬剤の付着した衣類、地下足袋等をよく水で洗ってください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 本剤は家畜が好んで食べて中毒を起こすことがあるので、保管に注意し、また散布直後の散布地域への家畜への放飼は行なわないでください。
- 使用残りの薬剤は必ず鍵のかかる安全な場所に保管してください。

## 保管に関する注意事項

- 本剤はリン、イオウ、アンモニア塩類およびアンモニア性肥料、ガソリン・灯油等の油類、強酸性物質、木・繊維類のような可燃物との混合は危険なので、同一保管をさけてください。
- 火気をさけ、直射日光の当たらない鍵のかかる低温で乾燥した場所に密封して保管してください。