

殺菌剤  
トリシクラゾール・フェリムゾン水和剤

®

# ノンブラスフロアブル

農林水産省登録 第20090号  
(協友アグリ(株)登録)

性状: 淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体  
毒性: 普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)  
危険物: 非該当  
有効年限: 4年, 1年(10ℓ:空散)  
包装: 500mℓ×20, 10ℓ

有効成分: トリシクラゾール・・・8.0%  
フェリムゾン(化管法第1種)・・・15.0%

殺菌剤分類 **16.1, U14**

ノンブラス®は協友アグリ(株)の登録商標です。

**特長**

○予防効果と治療効果を併せもち、いもち病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)等に高い効果を示します。散布後、速やかに稲体に浸透するので、降雨による影響が少なく、散布後の急な降雨や、降雨のあい間の散布でも防除効果を発揮します。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾン を含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 変色米 アルタナリア菌 エビコッカム菌 カーブラリア菌 もみ枯細菌病 内穎褐変病 稲こうじ病	1000倍	60~ 150ℓ	収穫7日前 まで	2回	散布	4回以内 (育苗箱への 処理は1回以内、 本田では 3回以内)	2回以内
	いもち病	300倍	25ℓ					
		原液	120mℓ					
		8倍	800mℓ					
		30倍	3ℓ					
8倍	800mℓ	無人ヘリ散布						

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度運動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし(二十世紀、幸水、新水等)等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

薬害

- 野菜類の幼苗およびなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管に関する注意事項

- 密栓し、直射日光をさげ、なるべく低温な場所に保管してください。