

殺菌剤
トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン粉剤

ノンブラス[®]バリダ[®]粉剤DL

農林水産省登録 第17955号
(協友アグリ(株)登録)

性状：類白色粉末
毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)
危険物：非該当
有効年限：4年
包装：3kg×8

有効成分：トリシクラゾール・・・0.5%
バリダマイシンA・・・0.3%
フェリムゾン(化管法第1種)・・・2.0%

殺菌剤分類 16.1, U18, U14

ノンブラス[®]は協友アグリ(株)の登録商標です。
バリダシン[®]は住友化学(株)の登録商標です。

特長
○予防効果と治療効果を併せもち、いもち病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病等に高い効果を示す『ノンブラス』と、紋枯病に高い効果を示す『バリダシン』との混合剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌)	3～4kg	収穫14日前 まで	2回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、 本田では 3回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は 1回以内、 本田では 5回以内)	2回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

薬害

- 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- きく(秀芳の力等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

安全使用上の注意事項

- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

保管に関する注意事項

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。