

殺菌剤  
トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン水和剤

農林水産省登録 第23690号  
(協友アグリ(株)登録)

性状：淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体  
毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)  
危険物：非該当  
有効年限：4年  
包装：500ml×20, 1ℓ×12, 5ℓ×4

# ノンブラス<sup>®</sup>バリダフロアブル<sup>®</sup>

有効成分：トリシクラゾール・・・8.0%  
バリダマイシンA・・・5.0%  
フェリムゾン(化管法第1種)・・・15.0%

殺菌剤分類 **16.1, U18, U14**

ノンブラス<sup>®</sup>は協友アグリ(株)の登録商標です。  
バリダシン<sup>®</sup>は住友化学(株)の登録商標です。

**特長**  
○予防効果と治療効果を併せもち、いもち病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病等に高い効果を示す『ノンブラス』と、紋枯病に高い効果を示す『バリダシン』との混合剤です。

## 適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾン を含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000倍	60~ 150ℓ	収穫14日前 まで	2回	散布	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、 本田では 3回以内)	6回以内 (育苗箱灌注は 1回以内、 本田では 5回以内)	2回以内
		300倍	25ℓ						
		8倍	800ml			無人ヘリ 散布			

## 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくことと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし(二十世紀、幸水、新水等)等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤を希釈倍数300倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

## 薬害

- 野菜類の幼苗およびなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず、あずき、いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- さく(秀芳の力等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

## 安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 薬液調製時および散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

## 保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。