

殺虫殺菌剤
エトフェンプロックス・トリシクラゾール・フェリムゾン粉剤

ノンブラス[®]トレボン[®]粉剤DL

農林水産省登録 第18173号
(協友アグリ (株) 登録)

性状：類白色粉末
毒性：普通物 (毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称)
危険物：非該当
有効年限：4年
包装：3kg×8

有効成分：エトフェンプロックス・・・0.5%
トリシクラゾール・・・0.5%
フェリムゾン (化管法第1種)・・・2.0%

殺虫剤分類	3A
殺菌剤分類	16.1, U14

ノンブラス[®]は協友アグリ (株) の登録商標です。
トレボン[®]は三井化学クロップ & ライフソリューション (株) の登録商標です。

特長
○予防効果と治療効果を併せもち、いもち病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、穂枯れ (ごま葉枯病菌) 等に高い効果を示します。
『ノンブラス』と、ウンカ類、カメムシ類、コブノメイガに速効的に効果を示す『トレボン』との混合剤です。仕上げ剤として適した薬剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) ツマグロヨコバイ ウンカ類	3～4kg	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、 本田では3回以内)	2回以内
	カメムシ類	4kg	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、 本田では3回以内)	2回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 - 関係機関 (都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等) に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

薬害

- 野菜類の幼苗およびなし (二十世紀、幸水、新水等) には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

蚕毒

- 蚕に対して長期間毒性があるので近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。