

殺虫殺菌剤 カルタップ・BPMC・プロベナゾール粒剤	農林水産省登録 第21317号 (住友化学(株)登録) 性状：類白色細粒 毒性：劇物 危険物：非該当 有効年限：4年 包装：3kg×8 (販売終了)
パダン®バッサ®オリゼメート®粒剤	

有効成分：カルタップ塩酸塩（化管法第1種）・・・4.0％
BPMC（化管法第1種）・・・4.0％
プロベナゾール（化管法第1種）・・・8.0％

殺虫剤分類	14, 1A
殺菌剤分類	P2

パダン®は住友化学(株)の登録商標です。
バッサ®はクミアイ化学工業(株)と日本農薬(株)の登録商標です。
オリゼメート®は三井化学クロップ＆ライフソリューション(株)の登録商標です。

特長
○パダンとバッサでイネミズゾウムシ、ウンカ類、コブノメイガやニカメイチュウ等の害虫に高い効果を示し、オリゼメートがいもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病に高い予防効果と残効性を発揮します。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	カルタップを 含む農薬の 総使用回数	BPMCを 含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ ウンカ類 イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病	3～4kg	収穫30日前 まで	2回以内	散布	6回以内（浸種前 は1回以内、浸種 後から直播では 種時又は移植時ま での処理は1回以 内）	5回以内	2回以内（移植時まで の処理は1回以内）
	イネミズゾウムシ	4kg						

使用上の注意事項

- 本剤を使用した場合には、チオシクロラム又はペンシルタップを含む剤は使用しないでください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 予防的に散布した場合に有効です。葉いもち防除の使用適期日は、初発の7～10日前であるので、発生予察情報に注意して時期を失しないように散布してください。穂いもち防除の使用適期は、出穂の3～4週間前です。
- 白葉枯病に対しては、移植後なるべく早い時期に使用の方が有効であるので、移植活着後（移植後7～10日）なるべく早く使用してください。出穂以降の白葉枯病、もみ枯細菌病に対する使用適期は、出穂3～4週間前です。
- もみ枯細菌病に対しては効果の不十分な場合があるので、もみ枯細菌病のみを対象とすることをさけ、穂いもち病等との同時防除を目的として使用してください。
- 湛水状態（湛水深3～5cm）でまきむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意し、また散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 砂質土及び漏水の大きな水田での使用はさけてください。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用をさけてください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- カルタップによる中毒に対しては動物実験でL-システイン製剤の投与が有効であると報告されています。BPMCによる中毒に対しては動物実験で硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。（刺激性）
- 皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。（弱い刺激性）
- 散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起すので、養殖池等周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物（甲殻類、ドジョウ）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。