殺菌剤

トリシクラゾール水和剤

ビーム™エイトゾル

農林水産省登録　第 17747 号
（クミアイ化学工業㈱登録）
性状：淡黄赤色粘稠水和性懸濁液体
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
有効年限：5ℓ：3 年、20ℓ：1 年
包装：5ℓ×4，20ℓ

有効成分：トリシクラゾール・・・・・・・・8.0%

殺菌剤分類 **16.1**

™はデュポン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびに関連会社または各所有者の商標です。

特　長

○ビームは、いもち病菌の侵入を防ぎ、安定した予防効果を示します。また、胞子形成阻害、胞子飛散阻止および病原力低下作用による二次感染阻止効果が高いため、発病後の散布でもその後の蔓延を抑制します。この特長は特に空中散布という広い面積の一斉防除で発揮されます。
○浸透移行性に優れているので、稲の茎葉から速やかに吸収移行し、葉いもち、穂いもちを防ぎます。残効性が長く、また、散布後の降雨等による影響も少ないため、長期間安定した高い防除効果を示します。
○ビームは他剤と交さ耐性を示さないため、他剤に耐性のいもち病菌に対しても高い防除効果を示します。同時に、ごま葉枯病の発生を抑える副次効果が確認されています。
○魚介類をはじめ、蚕、蜜蜂、天敵（クモ類、寄生蜂など）、鳥類に対する毒性は低い薬剤です。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	1000倍	60～150ℓ	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内（育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内）
		原液	150～200mℓ			空中散布	
		15～20倍	3ℓ				
		4～5倍	800mℓ				
		5～8倍				無人ヘリコプターによる散布	
		250倍	25ℓ			散布	

使用上の注意事項

●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
●長期間貯蔵しておくと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。なお、希釈する場合は所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
●散布機種の散布基準に従ってください。
●微量散布および少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
●無人ヘリコプターによる散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
●散布中、薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
●希釈倍数250倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用してください。
●散布薬液の飛散によって動植物特に野菜類の幼苗、なし（二十世紀、幸水、新水など）等の農作物の危被害や自動車の塗装などに被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
●水源池、飲料用水などに飛散流入しないように十分注意してください。
●作業終了後の注意事項
　・使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄してください。
　・機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。

安全使用上の注意事項

●眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
●皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管に関する注意事項

●密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。