

殺菌剤
トリシクラゾール水和剤

TM
ビームエイトゾル

農林水産省登録 第17747号
(クミアイ化学工業(株)登録)
性状：淡黄赤色粘稠水和性懸濁液体
毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称)
危険物：非該当
有効年限：5ℓ：3年、20ℓ：1年
包装：5ℓ×4、20ℓ

有効成分：トリシクラゾール・・・8.0％

殺菌剤分類 16.1

TMはデュボン、ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびに関連会社または各所有者の商標です。

- 特長**
- ビームは、いもち病菌の侵入を防ぎ、安定した予防効果を示します。また、胞子形成阻害、胞子飛散阻止および病原力低下作用による二次感染阻止効果が高いため、発病後の散布でもその後の蔓延を抑制します。この特長は特に空中散布という広い面積の一斉防除で発揮されます。
 - 浸透移行性に優れているので、稲の茎葉から速やかに吸収移行し、葉いもち、穂いもちを防ぎます。残効性が長く、また、散布後の降雨等による影響も少ないため、長期間安定した高い防除効果を示します。
 - ビームは他剤と交差耐性を示さないため、他剤に耐性のいもち病菌に対しても高い防除効果を示します。
 - 魚介類をはじめ、蚕、蜜蜂、天敵(クモ類、寄生蜂など)、鳥類に対する毒性は低い薬剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病	1000倍	60～ 150ℓ	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 （育苗箱への処理は 1回以内、 本田では3回以内）
		原液	150～ 200mℓ			空中散布	
		15～20倍	3ℓ				
		4～5倍	800mℓ			無人ヘリコプター による散布	
		5～8倍					
		250倍	25ℓ			散布	

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 長時間貯蔵しておくとは分離するので、使用前に容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。希釈する場合は所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
- 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし(二十世紀、幸水、新水等)等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 水田の水稻に希釈倍数250倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 空中散布及び無人ヘリコプターによる散布時は、散布機種散布基準に従い、以下の点に注意してください。
 - 微量散布及び少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
 - 散布液が漏れないように機体の配管、散布装置を十分点検してください。
 - 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意してください。
 - 作業終了後、機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。空容器は放置せず安全な場所に廃棄してください。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他と分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に密栓して保管してください。