

殺菌剤  
フェンピラザミン水和剤  
ピクシオDF

農林水産省登録 第23298号  
(住友化学(株)登録)

性状：褐色水和性細粒及び微粒  
毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)  
危険物：非該当  
有効年限：5年  
包装：100g×60(販売終了), 250g×20

有効成分：フェンピラザミン・・・50.0%

殺菌剤分類 17

ピクシオ®は住友化学(株)の登録商標です。

- 特長**
- 灰色かび病・菌核病に高い効果を示します。
  - 高い予防効果に加え、優れた治療効果(病斑進展阻止効果)を有します。
  - 浸透性、浸透移行性に優れ、作物の内部に侵入した菌に対しても高い効果を発揮します。
  - 既存薬剤に耐性を示す灰色かび病菌にも高い効果を発揮します。
  - 製剤は粉立ちが少なく取扱いやすいDF(ドライフロアブル)です。水に溶けやすく、泡立ちも少ない製剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェンピラザミンを 含む農薬の 総使用回数
かんきつ ぶどう	灰色かび病	2000倍	200～ 700ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
もも	灰星病	2000倍	200～ 700ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり トマト ミニトマト なす	灰色かび病 菌核病	2000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
豆類(未成熟)	菌核病	2000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
すいか メロン	菌核病	2000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
ピーマン	灰色かび病 菌核病	2000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
花き類・観葉植物	灰色かび病	2000倍	100～ 300ℓ	発病初期	4回以内	散布	4回以内

使用上の注意事項

- 薬液の調製は、まず本剤の所定量に少量の水を加えてかき混ぜ、その後所定量となるよう水を加え十分攪拌してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 施設で使用したあと、施設内に臭気が残る場合には換気を行ってください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

#### 安全使用上の注意事項

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合7日間は給桑しないでください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

#### 保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別した、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。