

ナラ枯防止用樹幹注入剤
トリホリン乳剤

微量注入用ウッドキング[®]DASH

農林水産省登録 第23301号

性状：淡褐色澄明液体

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

危険物：第四類第二石油類

有効年限：3年

包装：50ml

有効成分：トリホリン・・・15.0%

殺菌剤分類

3

ウッドキング[®]はサンケイ化学（株）の登録商標です。

特長

○高い予防効果

本剤をカシノナガキイムシの加害する前に樹幹注入することにより、カシノナガキイムシ穿入時に持ち込まれるナラ菌及びカシノナガキイムシの餌となるアンブロシア菌の増殖を長期※にわたって阻害し、枯損を阻止します。※2年間の残効を確認済み。

○優れた注入性

本剤を専用の微量注入器で処理することで注入不良に伴う効果不足及び注入容器の回収がなくなるため、既存の注入剤に比べ大幅に労力を低減します。

○高い安全性

人畜毒性は低く、魚介類に対する影響は少ない安全性の高い薬剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数
樹木類 (なら類を除く)	萎凋病	胸高直径 20cm未満 : 2.0ml 20cm~30cm : 2.5~3.0ml 30cm~40cm : 3.5~5.0ml 40cm~50cm : 5.5~8.0ml 50cm~60cm : 8.5~13.0ml 60cm以上:直径4cm増すごとに 0.5mlを追加	-	-	樹幹注入	-
なら類	萎凋病	胸高直径 20cm未満 : 2.0ml、 20cm~30cm : 2.5~3.0ml 30cm~40cm : 3.5~5.0ml 40cm~50cm : 5.5~8.0ml 50cm~60cm : 8.5~13.0ml 60cm以上:直径4cm増すごとに 0.5mlを追加	着葉期、 但し紅葉 始期まで	-	樹幹注入	-

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤はナラ枯れ予防用樹幹注入剤であり、カシノナガキイムシ加害前に処理することをおすすめします。
- 注入孔は樹幹下部の周囲に分散させ、ドリル等を用いて直径5mm程度の注入孔を斜め下方に約45度に傾けて主幹導管部まで孔を開けてください。
また、注入孔は薬剤注入量0.5ml当たり1つ孔を開け、専用の微量注入器を用いて点注してください。
- 薬剤注入量は、樹幹の胸高直径の大きさに従い、増減させてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は林業関係機関、林業技術者の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤を処理した樹木をきのご類のほだ木など栽培用には使用しないでください。
- 適用作物群に属する樹種又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、林業関係機関、林業技術者の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、注入の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とし落としてください。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気に十分注意してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。