

殺菌剤
フェリムゾン・フサライド水和剤

ブラシン®フロアブル

農林水産省登録 第19165号

(住友化学(株)登録)

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称)

危険物：非該当

有効年限：5年(500ml), 3年(5l)

包装：500ml×20, 5l×4

有効成分：フェリムゾン(化管法第1種)・・・15.0%
フサライド(化管法第1種)・・・15.0%

殺菌剤分類

U14, 16.1

ブラシン®は住友化学(株)の登録商標です。

特長

○ブラシンはいもち病防除剤として、またいもち病と米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害との同時防除剤として、低コスト・高品質米生産稲作時代に役立つ全く新しいタイプの稲病害の優れた防除薬剤です。

○広範囲の病原菌に高い活性:いもち病、ごま葉枯病菌をはじめ、米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害(変色米、すじ葉枯病、褐変穂、紅変米、稲こうじ病)や、バクテリア病害(内穎褐変病、褐条病、もみ枯細菌病)等幅広く稲の主要病原菌に活性を示します。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェリムゾン を含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	300倍	25l	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内
	褐条病 変色米 (カーブラリア菌) (エピコッカム菌) (アルタナリア菌)	1000倍	60~ 150l					
	稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 墨黒穂病	30倍	3l			空中散布		
		8倍	800ml			無人航空機 による散布		

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布してください。
- 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - 各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - 少量散布の場合は、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
 - 無人航空機による散布にあつては、散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - 散布薬液の飛散によって自動車やカートを塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - 作業終了後は次の事項を守ってください。
 - ・使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
 - ・機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
 - 水源地、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意してください。
- 褐条病を対象とした採種圃場での散布は、翌年の育苗箱中での本病の発生抑制を目的としているが、効果がやや劣ることがあるので、種子消毒処理を併用することが好ましいです。

- いもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できますが、多発時の内穎褐変病の防除には効果が劣ることがありますので注意してください。
- 希釈倍数 300 倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。