

展着剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル系展着剤

ベタリン[®]B

農林水産省登録 第 21205 号

性状：無色透明液体

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

有効年限：4 年

包装：100mL×60

有効成分：ポリオキシエチレンドデシルエーテル・・・・・・・・・・ 20.0%
(ポリ (オキシエチレン) = アルキルエーテル (PRTR・1 種) 10.8%)

ベタリン[®]はサンケイ化学㈱の登録商標です。

特 長

- 薬液のつきにくい作物に対しても、薬液が速やかに植物表面に拡がり、主剤の効果を安定させます。

適用および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液 10ℓ当り使用量 (希釈倍数)	使用方法
MEP 剤	ぶどう (休眠期)	40 ~ 60mℓ (167 ~ 250 倍)	添加
TPN 剤	茶 (摘採直後)	50mℓ (200 倍)	
殺菌剤・殺虫剤	稲、キャベツ、ねぎ類、さといも等 の薬液のつきにくい作物	8 ~ 12mℓ (833 ~ 1250 倍)	
	果樹、野菜等で薬液のつきやすい作物	4 ~ 8mℓ (1250 ~ 2500 倍)	

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤を添加する適用農薬の使用法、使用上の注意事項を厳守してください。
- 本剤は、ぶどうのブドウトラカミキリの冬期防除に際し、MEP 剤に添加して使用してください。
- 生育期散布において薬害を生じやすい薬剤に本剤を添加すると、薬害を助長する恐れがあるので使用をさけてください。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

保管に関する注意事項

- 直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。