

殺虫剤
プロフラニリド水和剤

マツガードフラッシュ[®]

農林水産省登録 第24593号
(三井化学クロップ & ライフソリューション (株) 登録)
性状：淡黄色水和性粘稠懸濁液体
毒性：普通物 (毒物及び劇物に該当しないものをいう通称)
危険物：非該当
有効年限：5年
包装：500ml × 2

有効成分：プロフラニリド・・・20.0%

殺虫剤分類 30

マツガードフラッシュ[®]は三井化学クロップ & ライフソリューション (株) の登録商標です。

特長

- 新規作用機構 (殺虫剤分類30) のプロフラニリドが有効成分です。
- 残効性に優れています。
- 耐雨性に優れ、散布、乾燥後に降雨があっても影響を受けにくい製剤です。
- 車の塗装や墓石に対して、変色や汚染などの影響がほとんどありません。
- 希釈性に優れた製剤です。
- いやな臭いがほとんどない製剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフラニリドを含む農薬の総使用回数
まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ 成虫	2000倍	3ℓ／本 (樹高10m)	成虫発生直前又は発生初期	4回以内	散布	4回以内

使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤によるマツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり、成虫発生直前又は発生初期に時期を失しないように散布してください。
- 散布液量は、樹高10mのまつ1本当たり3ℓを標準とし、木の大きさにより適宜増減し、樹冠部を中心に全面に散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 農薬使用者に係る注意事項
 - 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 - 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後 (少なくとも散布当日) に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- 蜜蜂に係る注意事項
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - 関係機関 (都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等) に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物 (甲殻類) に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。